

Darbepoetin alfa
ความแรง 30, 40 และ 120 'ไมโครกรัม
ต่อ 0.5 มิลลิลิตร
ชนิด สารละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า Alvonesp (อัลโวนेसป)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าดาเบโพอิติน อัลฟ่า (Darbepoetin alfa) เป็นยาในกลุ่มการต้านภาวะโลหิตจาง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาภาวะโลหิตจาง (เนื้อยล้า อ่อนเพลีย และหายใจลำบาก) ที่เกิดจากไตวายเรื้อรังในผู้ใหญ่และเด็ก และผู้ป่วยมะเร็งในผู้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัดที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยาเมื่อไร

- เคยแพ้ยาที่มีชื่อว่า Darbepoetin alfa หรือส่วนประกอบของยา (หรือยาอื่นในกลุ่มนี้)
- โรคความดันเลือดสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยาที่แพทย์สั่ง
- แพ้ยาสีดที่มีต้นกำเนิดมาจากการเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรือตัวทำละลาย

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในการต่อไปนี้
 - เป็นโรคความดันเลือดสูง และกำลังได้รับยา.r>รักษาความดันเลือดอยู่
 - เป็นโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคี้ยว (sickle cell anaemia)
 - เป็นโรคลมชัก
 - เป็นโรคตับ
 - เคยไม่ตอบสนองต่อการรักษาโรคโลหิตจางอย่างมีนัยสำคัญ
 - เป็นโรคตับอักเสบซี
 - กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
- หญิงตั้งท้องควรระมัดระวังการใช้ยา

- หากกำลังให้นมบุตร ควรหยุดการใช้ยาเนื่อง因为ไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- ไม่ควรใช้ยาที่ร่วมกับยาไข่โคลสพอร์ติน และแทโครลิมัส เนื่องจากยาที่ส่งผลต่อปริมาณเม็ดเลือดแดง

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- อ่านคู่มือการใช้เข็มฉีดยาให้ละเอียดก่อนฉีดยา หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลก่อนใช้ยา
- ตรวจสอบอนุภาคปุ่นเปื้อนก่อนใช้ยา เช่น สารละลายใส่เท่านั้นที่ฉีดได้
- ห้ามเขย่า

3.2 หากล้มฉีดยาควรทำอย่างไร

- ห้ามฉีดยาเข้าหากล้มฉีดยา
- ให้รับแจ้งแพทย์ทันที

3.3 ถ้าฉีดยาที่เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ความดันเลือดสูง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณกำลังใช้ยา วิตามิน สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณต้องดื่มน้ำหรือวางแผนที่จะดื่มน้ำ
- หากต้องการหยุดยาให้ปรึกษาแพทย์ก่อน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกด้า ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก

- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- เหนื่อยล้าผิดปกติ ไม่มีแรง

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว ง่วงนอน สับสน มองเห็นไม่ชัด คลื่นไส้ อาเจียน ชัก
- บวมหน้า

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยท่าไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ 2°C - 8°C องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาไว้ในตู้เย็น ห้ามแข็งแข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา สารละลายใส ไม่มีสี สำหรับฉีด ในกระบอกฉีดยาที่บรรจุยาพร้อมฉีด
- ตัวยาสำคัญ ดาเบโพอิติน อัลฟ่า (Darbepoetin alfa)
- ส่วนประกอบอื่นๆ ไดแก่ Sodium dihydrogen phosphate monohydrate (โซเดียมไดไฮดรอกฟอสฟอโนโนไซเดต) Disodium phosphate dihydrate (ไดโซเดียมฟอสฟอเดตไดไฮเดต) Sodium chloride (โซเดียมคลอไรด์) Polysorbate 80 (โพลีซอร์บেต 80) และ Water for injection (น้ำสำหรับฉีด) ผู้ผลิต Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. ประเทศไทย/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย บริษัท อัลโวน์ (ประเทศไทย) จำกัด เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ DDMMYY

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของอย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร