

ดอร์โซลาไมด์ ไฮโดรคลอไรด์ 20 มิลลิกรัม และ ทิโมลอล มาลีเอต 5 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร น้ำยาหยอดตา LEVISOPT (เลวิซอพท์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ดอร์โซลาไมด์ไฮโดรคลอไรด์ และ ทิโมลอลมาลีเอต มีตัวยาดอร์โซลาไมด์ไฮโดรคลอไรด์ 20 มิลลิกรัม และ ทิโมลอลมาลีเอต 5 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่ม ยาตา

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อลดความดันในลูกตา ในผู้ป่วยโรคต้อหิน ชนิดมุมเปิด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เมื่อหยอดตาแล้วตาพร่า
 - ผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับกระจกตา
 - ผู้ป่วยหอบหืด
 - ผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 - ผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
 - ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นนิ้วในไต
 - หญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่อยู่ระหว่างการให้นมบุตร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับ ชนิดและความรุนแรงของโรค
- ล้างมือให้สะอาด ก่อนใช้ยา
- เหยยหน้าขึ้น
- ใช้นิ้วมือดึงเปลือกตาล่างลงมาหยอดยา 1 หยดลงใน กระจกตา ระวังอย่าให้ปลายหลอดสัมผัส กระจกตา หรือสิ่งอื่นใด
- หลับตาไว้ประมาณ 2 นาที
- หากต้องการหยอดตาอีกข้างหนึ่ง ทำซ้ำในขั้นตอนข้างต้น
- กรณีใช้ร่วมกับยาหยอดตาชนิดอื่นให้หยอดยานี้ ภายหลัง 5 นาที
- ยานี้มีส่วนผสมของสารกันเสียอาจทำให้เกิดการระคายเคืองตาได้ ควรถอดคอนแทคเลนส์ก่อนใช้ยานี้และใส่คอนแทคเลนส์หลังใช้ยา 15 นาที

3.2 หากลืมหยอดยาควรทำอย่างไร

- หยอดยาทันทีที่นึกขึ้นได้
- ถ้าใกล้เวลาหยอดตาครบถัดไปให้ข้ามครั้งที่ลืมและไม่ต้องหยอดยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าหยอดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ถ้าหยอดยานี้เกินขนาด ปริมาณน้ำยาส่วนเกินจะไหลออกนอกลูกนัยน์ตา
- หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้ไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระมัดระวังไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสดวงตาหรือสิ่งอื่นใด
- ไม่ควรใช้ยานี้หลังจากเปิดใช้แล้ว 30 วัน
- ไม่ควรใช้ยานี้ ถ้าภาชนะบรรจุยาฉีกขาดก่อนที่จะเปิดใช้
- ไม่ควรขับรถ หรือทำงานโดยใช้เครื่องจักรจนกว่าตาจะมองเห็นได้ชัด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คัน เคืองตา ตาแห้ง ตาแดง มองเห็นภาพไม่ชัด

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรงโดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** สารละลายปราศจากเชื้อ สี ไม่มีสี
- **ตัวยาสำคัญ** ดอร์โซลาไมด์ไฮโดรคลอไรด์ และทิโมลอลมาลีเอต
- **ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่** โซเดียมซิทเรต, แมนนิทอล, เบนแซลโคเนียมคลอไรด์, ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส, โซเดียมไฮดรอกไซด์ และน้ำ

ผู้ผลิต บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จำกัด

1/38 หมู่ 4 ถนนเลียบคลองเจ็ด ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 02-9715335 แฟกซ์ 02-9715470

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 2564
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th/>