

## โซฟอสบูเวียร์/เวลปาทาสเวียร์

ความแรง 400 มิลลิกรัม/100 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด  
ชื่อทางการค้า มายเฮพ ออล (Myhep All®)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- โซ-ฟอส-บู-เวียร์ (sofosbuvir) และเวล-ป้า-ทาส-เวียร์ (velpatasvir) เป็นยาต้านไวรัสตับอักเสบบี

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง (สายพันธุ์ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6) ในผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไป

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นๆในยานี้
- ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับ** ยารักษาวัณโรค (เช่น ไรแฟมพิซิน, ไรฟาบูทีน, ไรฟาเพนทีน) ยารักษาอาการชัก (เช่น คาร์บามาซีพีน, ฟิโนบาร์บิทัล, ฟิโนโทอิน) และ เซนต์จอห์นส์เวิร์ต **เพราะอาจทำให้ยานี้ใช้ไม่ได้ผล**

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ➔ กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนที่จะตั้งท้อง หรือให้นมลูก
- ➔ เป็นโรคตับ โรคไต โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV)
- ➔ ไม่ใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- ➔ ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
- ➔ หากกำลังใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชื่อ อะ-มิ-โอ-ดา-โรน, วิตามินเค หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรบางชนิด
- ➔ กำลังกินยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาฟาริน เนื่องจากแพทย์อาจต้องตรวจเลือดของท่านบ่อยขึ้น

“ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้”

### 3. วิธีการใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามขนาดและวิธีใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

#### 3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมภายใน **18 ชั่วโมง** ให้กินทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมเกิน **18 ชั่วโมง** ให้รอกินยาเมื่อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หากอาเจียนภายใน 3 ชั่วโมงหลังกินยา ให้กินยาใหม่
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อันตรายที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้
- อาการข้างเคียงอื่นๆ ที่อาจไม่ได้รับระบุในเอกสารนี้

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์”

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- หยิบยาออกจากขวดเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา เม็ดรูปยาวรีปลายมน นูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีเขียวอ่อน ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “M” ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “SVF”

ส่วนประกอบของยานี้ คือ โคอพิริโดน, แลคโตส โมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส, ครอสคาร์เมลโลส โซเดียม, คอลลอยด์อล ซิลิกอนไดออกไซด์, แมกนีเซียม สเตียเรต, โพลีไวนิล แอลกอฮอล์, ไททาเนียม ไดออกไซด์, มาโครกอล, ทาลก์, อินดิโก คาร์มิน อลูมิเนียม เลก, ไอรอน ออกไซด์ เยลโล

ผู้ผลิต Mylan Laboratories Limited F-4 & F-12, MIDC Malegaon, Sinnar, Nashik -422113 Maharashtra ประเทศอินเดีย  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มิถุนายน พ.ศ. 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**