

กาบาเพนติน  
100 และ 300 มิลลิกรัม  
ชนิดแคปซูล  
ชื่อการค้า Berlontin (เบอร์ลอนติน)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า กาบาเพนติน (gabapentin) อยู่ใน  
กลุ่มยากันชัก

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาอาการ
- เพื่อบรรเทาอาการปวดปลายประสาท

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์ก่อนใช้ยาในกรณีต่อไปนี้เพราะอาจ  
ทำให้โรครุนแรงขึ้นหรือเกิดอันตรายจากยานี้  
มากขึ้น เช่น
  - เป็นโรคไตหรืออยู่ระหว่างการฟอกไต
  - มีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าหรือเคยมีอาการ  
ผิดปกติทางจิต
  - ปวดกล้ามเนื้อ
  - อ่อนเพลีย
  - ปวดท้องตลอดเวลา
- แจ้งแพทย์หากกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาลดกรด ยาคุมกำเนิดชนิด  
รับประทาน มอร์ฟิน เพราะอาจมีผลต่อการรักษา  
หรือเกิดอันตรายได้

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ  
เภสัชกรอย่างเคร่งครัด เพราะขนาดและ  
ระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรง  
ของโรค
- กลืนยาทั้งเม็ดโดยกินพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป  
ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2  
เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ  
ที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระวังการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับ  
เครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตก  
จากที่สูง
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตาม  
คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม  
ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา เพราะยานี้อาจ  
เพิ่มอาการซึมเศร้าและทำให้มีความคิดที่จะฆ่าตัว  
ตาย ให้ปรึกษาแพทย์ทันทีเมื่อเริ่มมีความรู้สึก  
ซึมเศร้าหรืออยากทำร้ายตัวเอง

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง  
หรือเลือดออกผิดปกติ
- บัสสาวะผิดปกติ เช่น บัสสาวะบ่อย บัสสาวะมีเลือด
- กลั้นอุจจาระไม่อยู่ เลือดออกทางก้น อาเจียนเป็น  
เลือด
- ตอม่านเหลืองบริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบบวม
- การเคลื่อนไหวผิดปกติ น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- อารมณ์ผิดปกติ ทำร้ายร่างกายตนเอง ซึมเศร้า  
"หากมีอาการข้างต้นหรืออาการผิดปกติอื่นๆ  
ที่รุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันที"

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- มึนงง ง่วงนอน อ่อนล้า
- บวมที่แขน ขา

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะออกจากแผงเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง  
โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศา  
เซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ  
ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

ยาเบอร์ลอนทิน 100 เป็นยาแคปซูลสีขาวขุ่น มีอักษร "B" และ "100" บนแคปซูล

ยาเบอร์ลอนทิน 300 เป็นยาแคปซูลสีเหลือง มีอักษร "B" และ "300" บนแคปซูล

### ส่วนประกอบ

ยาเบอร์ลอนทิน 100 ประกอบด้วยตัวยาบาเพนดิน 100 มิลลิกรัม

ยาเบอร์ลอนทิน 300 ประกอบด้วยตัวยาบาเพนดิน 300 มิลลิกรัม

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ corn starch และ talc

ผู้ผลิต บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 7 มีนาคม 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร