

**พินาไฟเบรต**  
**ความแรง 0.1 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม**  
**ชื่อการค้า PARMODIA® (พาร์โมเดียม)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า พินาไฟเบรต (pemafibrate) เป็นยาในกลุ่มลดไขมันในเลือด

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้รักษาควบคู่กับการควบคุมอาหารเพื่อลดระดับไตรกลีเซอไรด์ ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ รวมถึงภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- × ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- × ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะตับทำงานผิดปกติรุนแรง โรคตับแข็งปานกลางหรือรุนแรง ทางเดินน้ำดีอุดตัน
- × ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะการทำงานของไตบกพร่องรุนแรง
- × ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีนิ่วในถุงน้ำดี
- × ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะมีลูก
- × ห้ามใช้ในผู้ที่กำลังใช้ยาไซโคลสปอริน (cyclosporin) หรือยาไรแฟมปีน (rifampin)

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - เป็นผู้ป่วยโรคตับ หรือเคยเป็นโรคตับ
  - เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของไตบกพร่องปานกลาง
  - เป็นผู้ป่วยที่เคยมีภาวะนิ่วในถุงน้ำดี
  - กำลังให้นมลูก
  - ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่
- สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อถัดไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ผู้หญิงที่กำลังให้นมลูก ต้องงดให้นมลูกในขณะที่ใช้ยานี้

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นตะคริว
- เบื่ออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง มีสภาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- เจ็บคอ
- คันทา คันจุก จาม น้ำมูกใส
- คันผิวหนัง

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- **ลักษณะยา** เป็นเม็ดสีขาว รูปร่างกลม ด้านหนึ่งมีคำว่า Kowa 217 อีกด้านมีขีดแบ่งครึ่ง
- **ตัวยาสำคัญ** พินาไฟเบรต
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** แลคโตสไฮเดรต, ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม, ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส, ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส, แมกนีเซียมสเตียเรต

ผู้ผลิต บริษัท โคว่า จำกัด ประเทศญี่ปุ่น  
ผู้นำเข้า บริษัท โคว่า (ประเทศไทย) จำกัด  
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท โคว่า (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**