

อะทอวาสแตติน
ความแรง 10, 20, 40, 80 มิลลิกรัม
ชนิด เม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า CHLOVAS-ZIS 10, 20, 40, 80
(คลอวาส-ซิส 10, 20, 40, 80)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า อะทอวาสแตติน (atorvastatin) มีตัวยา 10, 20, 40 หรือ 80 มิลลิกรัม เป็นยาลดไขมันในเลือด
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหาร เพื่อ
- ไขมันในเลือด
 - ไขมันในหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
 - ⊗ เมื่อตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก
 - ⊗ ผู้ป่วยที่มีอาการโรคตับกำเริบ
 - ⊗ ผู้ที่กำลังใช้ยารักษาโรคเชื้อราโพซาโคนาโซล เพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงต่อกล้ามเนื้อและไตวายเฉียบพลัน แต่หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น** ดิจอกซิน สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - กินยานี้วันละครั้ง เวลาใดก็ได้โดยให้เป็นเวลาใกล้เคียงกันอย่างสม่ำเสมอ กินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
- 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**
- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมกินเกิน 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- 4.1 ระหว่างใช้ยานี้ควรปฏิบัติอย่างไร**
- กินยาน้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
 - พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แขนงอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - เกิดอาการพิษต่อกล้ามเนื้อ คือ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น่อง หลังหรือตามตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง กัดเจ็บ ตะคริวกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหดเกร็งหรือแข็งเกร็ง บัสสาวะสีเข้ม หรือสีน้ำตาล ถ่ายบัสสาวะลำบากหรือ บัสสาวะออกน้อยลง
 - เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง ปวดท้องรุนแรง อ่อนเพลียรุนแรง ตัวเหลือง ตาเหลือง อุจจาระสีซีด บัสสาวะสีเข้มหรือสีน้ำตาล
 - อาการอ่อนแรง เพลีย อัมพาตซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย
 - หายใจลำบาก ไอแห้ง น้ำหนักลด อ่อนล้าและมีไข้
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- หลงลืม ความจำบกพร่อง นอนไม่หลับ ผื่นร้าย สับสน

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- แยกยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เป็นยาเม็ดกลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีขาว มี 4 ความแรง ดังนี้
 - อะทอวาสแตติน ความแรง 10, 20 มิลลิกรัม ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ
 - อะทอวาสแตติน ความแรง 40, 80 มิลลิกรัม ด้านหนึ่งมีขีดกากบาท อีกด้านหนึ่งเรียบ
 - **ตัวยาสำคัญ** อะทอวาสแตติน
 - **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ส่วนประกอบของเม็ดยา ได้แก่ แลคโตสโมโนไฮเดรต, วิตามินอี 50%, อีดีเตทไดโซเดียม, โลว์-สับสตีตวาทเดทไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส, โซเดียมลอริลซัลเฟต, โซเดียมคาร์บอเนต, เพียวริฟายวอเตอร์*, ครอสคาเมลโลสโซเดียม, โซเดียมสเตราซ์โกโคเลต, ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส, คอลลอยด์ดอลซิลิกอนไดออกไซด์, แมกนีเซียมสเตียเรท
- ส่วนประกอบของสารเคลือบฟิล์ม** ได้แก่ โอปาตราย® เอเอ็มบี 2 ไรท์, เพียวริฟายวอเตอร์*
- *ระเหยออกไปในระหว่างกระบวนการผลิต

ผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมต จำกัด (สาขา) ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 27 สิงหาคม 2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีระยะให้นมบุตร
2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
3. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนแรง หลังหรือตามตัว ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์
4. ควรตรวจการทำงานของตับก่อนได้รับยาและหลังได้รับยา 6 และ 12 สัปดาห์ ผู้ที่ได้รับยานี้เป็นประจำควรตรวจทุก 6 เดือน หรือตามคำแนะนำของแพทย์ หากระดับ transaminase สูงกว่า upper normal limit 3 เท่า ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์
5. ระวังเมื่อใช้ร่วมกับยา digoxin, warfarin เนื่องจากระดับยาเหล่านี้ในเลือดอาจสูงจนเกิดอันตรายได้
6. ความเสี่ยงของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อฝัดปกติ (myopathy) หรือ ภาวะกล้ามเนื้อละลาย (rhabdomyolysis) จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อให้ยากลุ่มนี้กับยาอื่นต่อไปนี้ เช่น ยากลุ่ม azole antifungals เช่น ketoconazole, itraconazole เป็นต้น ยากลุ่ม macrolides เช่น erythromycin, clarithromycin เป็นต้น ยากลุ่ม HIV protease inhibitors เช่น indinavir, ritonavir, nelfinavir, saquinavir เป็นต้น ยา verapamil, ยา diltiazem, ยา gemfibrozil, ยา nicotinic acid, ยา cyclosporine, ยา amiodarone เป็นต้น
7. ความเสี่ยงของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อละลาย (rhabdomyolysis) จะเพิ่มขึ้นในภาวะเหล่านี้ เช่น การใช้ยาขนาดสูง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีการทำงานของตับ หรือไตบกพร่อง ผู้ที่ติดสุราเรื้อรัง ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (hypothyroidism) เป็นต้น
8. ระวังการใช้ยานี้ร่วมกับ colchicine โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง เนื่องจากมีความเสี่ยงเกิดภาวะกล้ามเนื้อฝัดปกติ (myopathy) หรือภาวะกล้ามเนื้อละลาย (rhabdomyolysis)
9. การใช้ยานี้ อาจเพิ่มความเสี่ยงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**