

ไมโคฟีโนเลตโมฟีทิล
ความแรง 500 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า Mycophenolate Teva 500
(ไมโคฟีโนเลต เทวา 500)

1. ยานี้คือยาอะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า ไมโคฟีโนเลตโมฟีทิล (mycophenolate mofetil) อยู่ในกลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายตับ ไต หรือ หัวใจ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบในยานี้
 - กำลังตั้งท้องหรือให้นมลูกหรือวางแผนจะตั้งท้อง หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ให้ตรวจการตั้งท้องก่อนใช้ยา
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากมีภาวะต่อไปนี้
 - มีอาการของการติดเชื้อ เช่น มีไข้ เจ็บคอ
 - มีรอยช้ำหรือเลือดออกอย่างไม่รู้สาเหตุ
 - ผู้ป่วยหญิงต้องตรวจการตั้งท้องก่อน เพราะยาอาจทำให้แท้งหรือทำให้เด็กพิการได้
 - รู้ว่ามึนหรือมีอาการเวียนศีรษะ
 - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาคุมกำเนิด • ยาลดกรดหรือยายับยั้งการหลั่งกรด • ยาต้านแบคทีเรียบางชนิด • ยาจับฟอสเฟต • โคลีสไตรามีน • ริแฟมพิซิน • ไอซาวูโคนาโซล • เทลมิซาร์แทน

“ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่”

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามหักหรือแบ่งยา
- 3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร**
- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งที่ได้รับบริการว่ากำลังใช้ยานี้อยู่
- ห้ามหยุดยาเอง ให้กินยานี้ติดต่อกันตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ก่อนฉีดวัคซีนให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทราบ ว่ากำลังใช้ยานี้อยู่ เพราะยานี้อาจลดประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดเชื้อเป็น
- งดการบริจาคเลือดในระหว่างใช้ยานี้ และงดต่อไปอีก 6 สัปดาห์หลังหยุดยา
- ต้องคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ เพราะยานี้ทำให้เกิดอันตรายต่อทารก และเมื่อรู้ว่าตั้งท้องต้องรีบมาปรึกษาแพทย์ทันที
- ผู้ป่วยชายและคู่สนควรคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ และอีก 90 วันหลังจากหยุดยา
- ไม่บริจาคอสุจิขณะใช้ยานี้และอีก 90 วันหลังจากหยุดยา
- หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยสวมใส่เสื้อผ้า และทาครีมกันแดด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - มีอาการของโรคติดเชื้อ เช่น มีไข้ เจ็บคอ
 - มีรอยช้ำหรือเลือดออกอย่างไม่รู้สาเหตุ
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**
- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**
- อาเจียน วิดกักกล นอนไม่หลับ เวียนหัว ปวดหัว หัวใจเต้นเร็ว ท้องเสีย ท้องผูก อาหารไม่ย่อย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ไมโคฟีโนเลต เทวา 500 ชนิดเม็ด

ลักษณะ: ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ผิววูน 2 ด้าน รูปร่างคล้าย
แคปซูล สีม่วง ด้านหนึ่งสลักตัวอักษร 'AHI' และอีกด้าน
สลักตัวเลข '500'

ตัวยาสำคัญ: ไมโคฟีโนเลตโมฟีทิล (Mycophenolate
Mofetil 500 มิลลิกรัม)

ส่วนประกอบอื่นๆ: เซลลูโลส ไมโครคริสตัลไลน์, โพร
โตน, ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส, ครอสคาร์เมลโลส
โซเดียม, ทัลก์, แมกนีเซียม สเตียเรท

ผู้ผลิต: Intas Pharmaceuticals Limited
Gujarat, India

ผู้นำเข้า: บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ:
25 มีนาคม 2563

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร