

ข้อห้ามยาทางยา เดส-ลอรธาติน ความแรง 5 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด ชื่อการค้า DESTA (เดสตา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าเดสตา (DESTA) มีตัวยาเดส-ลอรธาติน 5 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อ
- บรรเทาอาการต่างๆของจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เช่น อาการจาม น้ำมูกไหล คันจมูก คัด/แน่นจมูก น้ำตาไหล ตาแดง คันคอ และไอ
- ใช้บรรเทาอาการต่างๆของลมพิษ เช่น บรรเทาอาการคัน จำนวนและขนาดของผื่น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้หรือตัวยาลอธาติน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - กำลังตั้งครรภ์
 - กำลังให้นมบุตร เพราะยาถูกขับออกทางน้ำนมได้ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้
 - เป็นโรคไต
 - เป็นโรคลมชัก
 - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อน หากมีการใช้ยาอื่นอยู่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้นเพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากใช้ยานี้แล้วมีอาการวงเวียนศีรษะ ตาพร่า ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพราะอาจทำให้วงเวียนศีรษะมากขึ้น
- ถ้าต้องทำการทดสอบภูมิแพ้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษบวมที่ใบหน้าเปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืดเป็นลม แน่นหน้าอกหายใจลำบาก
- ผื่นแดงตุ่มพองผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- เหนื่อย หรืออ่อนเพลียรุนแรง
- หัวใจสั่น หรือหัวใจเต้นผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- วงเวียนศีรษะ
- ปวดศีรษะ
- ปากแห้ง
- ตาแดงหรือเคืองตา

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้งอย่าให้โดนแสงโดยตรงโดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว ไม่นำไปแช่ตู้เย็น
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เม็ดกลมมนเคลือบฟิล์มสีฟ้า เรียบทั้งสองด้าน
- ตัวยาสำคัญ เดส-ลอรธาติน 5 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ Microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส), Anhydrous dibasic calcium phosphate (แอนไฮดรัส ไดเบสิก แคลเซียม ฟอสเฟต), Corn starch (แป้งข้าวโพด), Talc (ทัลค), Polyvinyl alcohol (โพลีไวนิล แอลกอฮอล์), Polyethylene glycol (โพลีเอทิลีน ไกลคอล), Titanium dioxide (ไทเทเนียม ไดออกไซด์), Lake indigo carmine (สีเลค อินดิโก คาร์มิน)

ผู้ผลิต บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด, ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 2566

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ยานี้อาจทำให้วงได้บ้างในผู้ป่วยบางราย ผู้ที่ขับขี่ยานยนต์หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง ควรทดสอบก่อนว่ารับประทานยานี้แล้วไม่่วง
2. ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก สตรีให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน
3. ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไต
4. การใช้ยานี้ร่วมกับยาด้านจุลชีพกลุ่ม Macrolides เช่น erythromycin หรือยาด้านเชื้อรากลุ่ม imidazole เช่น ketoconazole จะทำให้ระดับยานี้ในเลือดสูงขึ้น