

## ซีลีค็อกซิบ 200 และ 400 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล ชื่อการค้า Cebrex™ (ซีเบเร็กซ์™)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ซีลีค็อกซิบ (Celecoxib)

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อบรรเทาอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด โรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์
- เพื่อรักษาอาการปวดเฉียบพลัน อาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ
- เพื่อรักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ ส่วนประกอบของยานี้ หรือแพ้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ตัวอื่น หรือแอสไพริน
- เคยแพ้ยาในกลุ่มซัลโฟนาไมด์
- หญิงตั้งครรภ์ หรือ หญิงให้นมทารก
- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- เป็นโรคตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
- เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง หรือโรคหลอดเลือดสมอง
- เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน หรือเคยมีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง
- ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจในระยะหลังผ่าตัดใหม่ๆ
- มีแผลทะลุที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น

### 2.2 เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- อายุมากกว่า 65 ปี
- เคยมีเลือดออกหรือมีแผลที่กระเพาะอาหาร
- เป็นโรคตับ หรือไตทำงานผิดปกติ
- เป็นโรคความดันเลือดสูง เบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ หรือมีอาการบวม (น้ำคั่งในร่างกาย)
- เป็นโรคหืด
- วางแผนจะตั้งครรภ์
- มีการสูญเสียน้ำ เช่น ไม่สบายและท้องเสีย รับประทานยาขับปัสสาวะ
- กำลังได้รับการรักษาโรคติดเชื้อ เนื่องจากยาซีเบเร็กซ์ อาจบดบังอาการไขซึ่งเป็นการแสดงของการติดเชื้อได้

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 กินยานี้อย่างไร

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หรือตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
- กินยานี้พร้อมอาหาร

#### 3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือภาชนะบรรจุทันทีหากมีอาการผิดปกติ

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้นี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างใช้นี้ เพราะอาจเพิ่มความเสียหายให้ตับและไตทำงานผิดปกติ

- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการมึนงงได้ในบางคน หากกินยาแล้วมีอาการมึนงง หรือมองเห็นผิดปกติ ควรหลีกเลี่ยงการขับซิ่งหรือทำงานกับเครื่องจักร
- ควรใช้ยาในขนาดต่ำที่สุดที่ให้ผลในการรักษา และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ยกเว้นในกรณีที่แพทย์แนะนำ

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้ มีอาการคล้ายเป็นหวัด
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ดีซ่าน ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติที่ตับ
- เจ็บเค้นหน้าอกรุนแรง
- ปวดท้องรุนแรง มีเลือดออกในทางเดินอาหาร ปวดท้องรุนแรง อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระสีดำ

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- มึนงง ปวดหัว
- ไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ระบบขับถ่ายผิดปกติ ท้องอืด แสบท้อง

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว และเก็บให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- สามารถดูข้อมูลลักษณะและส่วนประกอบของยานี้เพิ่มเติมได้ในเอกสารกำกับยาฉบับเต็ม
- ผู้นำเข้า บ. ไฟเซอร์ พาร์ค เดวิส (ประเทศไทย) จำกัด  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ธันวาคม 2562

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์  
หรือเภสัชกร**

PIL Title: Celecoxib 200, 400 mg (Cebrex™)

PIL rev.no.: 10.3

Country: Thailand

Reference: LPD rev. no. 18.1

PIL Revision no:10.3

PIL date: December 20, 2019

Country: Thailand