

**พิเพอราซิลลิน/ทาโซแบ็กแทม
ความแรง 2 กรัม/0.25 กรัม และ
4 กรัม/0.5 กรัม
ชนิดฉีด**

**ชื่อการค้า TAZPEN 2.25 G และ 4.5 G
(แทสเพิน 2.25 และ 4.5 กรัม)**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าพิเพอราซิลลินและทาโซแบ็กแทม (piperacillin และ tazobactam) ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลินผสมกับยาต้านเอนไซม์เบตาแล็กตามเอส

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียแบบรุนแรงที่ไวต่อยานี้ ได้แก่

- ติดเชื้อภายในช่องท้อง เช่น ไส้ติ่งอักเสบ เยื่อช่องท้องอักเสบ
- ติดเชื้อในท่อทางเดินน้ำดี
- ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ
- ติดเชื้อที่ผิวหนัง
- ติดเชื้อในเลือด
- ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
- มีไข้และตรวจพบเม็ดเลือดชนิดนิวโทรฟิลต่ำ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มเพนิซิลลิน กลุ่มเซฟาโลสปอริน หรือยาอื่นในกลุ่มเบตาแล็กแทม

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
- มีประวัติการแพ้ยาหลายชนิด
- มีอาการผื่นแดง ระบายเคืองหรือบวม
- ท้องร่วง

- โรคไตบกพร่อง หรือกำลังฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ
- ต้องจำกัดเกลือโซเดียม
- เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิสซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่ง

ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น

- ยาคลายกล้ามเนื้อบางชนิด เช่น เวดูโรเนียม
- ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วอร์ฟาริน โซเดียม
- ยาเมโทเทริกเซตซึ่งใช้รักษามะเร็ง โรคข้อและเรื้อนกวาง
- ยาโพรเบนซิดซึ่งใช้รักษาโรคเก๊าต์
- ยาต้านเชื้อแบคทีเรียอื่นบางชนิด เช่น แวนโคไมซิน ยาเทระไซคลิน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้สำหรับหยดเข้าสู่หลอดเลือดดำภายใต้การดูแลของแพทย์หรือพยาบาล

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากลืมมาฉีดยาหรือสงสัยว่าไม่ได้รับยาตามกำหนดให้รีบแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชัก ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ให้รับยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ตาเหลือง ตัวเหลือง
- ท้องร่วง รุนแรง ร่วมกับมีไข้ หรืออ่อนเพลีย
- ปัสสาวะมีสีแดง หรือน้ำตาล
- เลือดกำเดาไหล มีรอยฟกช้ำ
- ชัก

“หากมีอาการเหล่านี้

“**ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที**”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ
- แผลในปาก
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง
- ความดันเลือดต่ำ
- ปวด บวม หลอดเลือดดำอักเสบบริเวณที่ฉีดยา
- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ

“**ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร**”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้จะเก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็ง

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา :** ผงยาปราศจากเชื้อสีขาวถึงสีเกือบขาว
- **ตัวยาสําคัญ :** พิเพอราซิลลินและทาโซแบ็กแทม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ :** ไม่มีส่วนประกอบอื่น

ผู้ผลิต: บริษัท ไมแลน แลบบอราทอรีส์ ลิมิตเต็ด
ประเทศอินเดีย

ผู้นำเข้า: บริษัท เมต้า ฟามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: ธันวาคม 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**