

แอสิทโรไมซิน
ความแรง 250 มิลลิกรัม
ชนิด แคปซูล
ชื่อการค้า MILZITH (มิลซิท)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าแอสิทโรไมซิน (Azithromycin) เป็นยาปฏิชีวนะอยู่ในกลุ่มแมโครไลด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยา เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ ทอนซิลอักเสบ คอหอยอักเสบ โพรงอากาศอักเสบ การติดเชื้อแบคทีเรียในหู คิวหนัง หรือโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อคลาไมเดีย

1.3 ยานี้ไม่มีประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาปฏิชีวนะกลุ่มแมโครไลด์
- ⊗ หากท่านกินยา รักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน ได้แก่ เออร์โกทามีน
- ⊗ หากท่านเป็นโรคตับขั้นรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีปัญหาโรคไต โรคตับ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
 - ให้นมบุตร

3. วิธีการใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยานี้ในผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุ น้ำหนัก ตำแหน่งที่เกิดโรค และการตอบสนองต่อการรักษา

3.2 หากลืมกินควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ กินยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

4.1 ระหว่างใช้ยานี้ควรปฏิบัติอย่างไร

- ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามมีจะนั้นเชื้อจะดีอยู่
- กินยาเม็ดในขณะที่ท้องว่าง คือกินยา 1 ชั่วโมงก่อนอาหาร หรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง คิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามคิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - ลึนสีซีด
 - มีไข้สูง หนาวสั่น ไอ และเจ็บคอ
 - หัวใจเต้นเร็ว ความดันต่ำ
 - ชัก
 - ตัวเหลือง ตาเหลือง
 - สูญเสียการได้ยิน
 - คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง อาเจียนใน 1 ชั่วโมงหลังกินยา
 - ถ่ายเหลวรุนแรง หรือปนเลือด อุจจาระสีดำหรือสีซีด บัสสาวะผิดปกติ (ปริมาณและความถี่) บัสสาวะเหลืองเข้มผิดปกติ
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ บ้านหมุน
- ปวดข้อ
- ชาตามร่างกาย
- เป็นผื่นคัน

- มีเสียงในหู
 - คิวหนังไวต่อแสง
 - อ่อนเพลียผิดปกติ
 - การรับรสไม่ดี เบื่ออาหาร ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องผูก ท้องเดิน
 - มีฝ้าขาวในปาก คอ คันช่องคลอด
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- แยกยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** แคปซูลสีขาวขุ่น เบอร์ 0 ภายในบรรจุผงยาสีขาวถึงขาวเหลือง
- **ตัวยาสําคัญ** แอสิทโรไมซิน
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ ไนซีสตราซ, แลคโตสแอนไฮดรัส, โซเดียมลอริลซัลเฟต, แมกนีเซียมสเตียเรต

ผู้ผลิต บริษัท มิลลิเมต จำกัด ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 24 สิงหาคม 2563

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร