

เบนราลีซูแมบ  
ความแรง 30 มิลลิกรัม  
ชนิดสารละลาย  
บรรจุในกระบอกฉีดยาพร้อมฉีดยา  
ชื่อการค้า Fasenra (ฟาเซนรา)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า เบน-รา-ลี-ซู-แมบ (benralizumab)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาโรคหอบหืดที่พบเม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิลในทางเดินหายใจที่มีความรุนแรง

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่ก่อนใช้ยานี้
- อายุต่ำกว่า 18 ปี
- เป็นโรคติดเชื้อปรสิต ติดเชื้อพยาธิ หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิ
- มีประวัติเกิดภาวะแพ้จากการฉีดยาหรือแพ้ยาอื่น
- หญิงตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือหญิงให้นมทารก

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ใช้ยานี้อย่างไร

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หรือตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้แก่ท่าน

### 3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันทีที่นึกขึ้นได้หรือไปโรงพยาบาลโดยเร็ว

### 3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันทีหากมีอาการผิดปกติ

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นใช้ ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- ไม่หยุดการรักษาเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะอาจทำให้อาการของโรคกำเริบ
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรือผลจากการใช้ยา
- สังเกตอาการโรคหอบหืดของท่านและแจ้งแพทย์หากอาการแย่ลง มีอาการหอบหืดกำเริบบ่อยขึ้น

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้นบวม
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์

ยกเว้นกรณีที่อาการรุนแรง

- ปวดหัว มีไข้
- เจ็บคอ
- บวมแดงระคายเคืองบริเวณที่ฉีดยา

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้เก็บยานี้ให้แก่ท่าน

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส
- ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็ง ห้ามเขย่ายา
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะเป็นสารละลายใส ไม่มีสีหรือมีสีเหลืองอ่อน
- ส่วนประกอบอื่น ได้แก่ ฮิสติดีน, ฮิสติดีน ไฮโดรคลอไรด์ โมโนไฮเดรต, ทรีฮาโลส ไตรไฮเดรต, โพลีซอเบต 20, น้ำปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

นำเข้าโดย

บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 27 ธันวาคม 2562

