

**ลาทาโนโปรสแตและทิโมลอล  
0.05 และ 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  
ชนิด ยาหยอดตา  
ชื่อการค้า Latoprost-T  
(ลาโทพรอสแต-ที)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีตัวยาคือ ลาทาโนโปรสแต (Latanoprost) 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ ทิโมลอล (Timolol) 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

ยานี้ใช้สำหรับลดความดันภายในลูกตาและรักษาโรคต้อหินชนิดมุมเปิดในผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยตัวยาเพียงชนิดเดียว

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ เป็นหรือเคยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่รุนแรง
- ⊗ เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจที่มีอาการรุนแรงหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
  - กำลังให้นมลูกหรือวางแผนจะให้นมลูก
  - เป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจ
  - มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
  - เป็นโรคเบาหวาน
  - เป็นหรือเคยเป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป
  - กำลังจะหรือเคยมีประวัติการผ่าตัดบริเวณดวงตา (รวมถึงผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก)

- มีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับตา เช่น ตาแห้ง ตาอักเสบ กระจกตา มองเห็นภาพไม่ชัด
- เคยมีอาการแพ้สิ่งต่าง ๆ อย่างรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
- มีหรือเคยมีอาการติดเชื้อเริ่มที่ตา

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- **วิธีใช้ยาหยอดตา**
  1. ล้างมือให้สะอาด
  2. ตรวจสอบสภาพของยาก่อนใช้
    - อย่าใช้ยานี้ถ้ามีน้ำยาขุ่นหรือขุ่น
    - อย่าใช้ยานี้หากภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
  3. นอนหงายหรือเงยหน้าขึ้น แล้วหยอดตาข้างที่มีอาการ ครั้งละ 1 หยด วันละ 1 ครั้ง
  4. ขณะใช้ยาหยอดตา ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้บริเวณปลายหลอดหยดสัมผัสกับดวงตา ขนตา มือหรือสิ่งอื่น ๆ
  5. หลังจากหยอดตาอาจใช้นิ้วมือกดหัวตาเบา ๆ ประมาณ 2 นาที เพื่อลดผลข้างเคียงของยาต่อร่างกาย
  6. หากใช้ยาหยอดตาหรือยาป้ายตาชนิดอื่นร่วมด้วย ควรใช้ห่างกันอย่างน้อย 5 นาที

**3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร**

- ให้รอหยอดตาครั้งต่อไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนหยดหรือจำนวนครั้งของการหยอดตา

**3.3 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ถอดคอนแทคเลนส์ ก่อนใช้ยาหยอดตาทุกครั้ง และสามารถสวมใส่คอนแทคเลนส์ได้หลังจากหยอดตาไปแล้วอย่างน้อย 15 นาที
- งดการขับชี่ยานพาหนะหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้สายตาจนกว่าสายตาจะกลับมามองเห็นได้ตามปกติ **เพราะยานี้อาจทำให้ตาพร่ามัวชั่วคราว**
- หากใช้ยานี้แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนิ่งหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
  - มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก
  - ไอ หายใจเหนื่อยหอบมากขึ้น
  - ความดันโลหิตต่ำ ขาบบริเวณปลายมือ เท้า หรือมือ เท้าเย็น เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงได้น้อย
  - ตามวม ตามีความไวต่อแสง
- "ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- มานตามีสีเข้มขึ้น
- กระจกตา แสบ คันตาหรือรู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตา
- ปวดหัว
- ตาแดง เยื่อตาอักเสบ มองเห็นภาพไม่ชัด น้ำตาไหล เปลือกตาอักเสบ กระจกตา ผิวนิ่งลอกตา
- ผื่นคันตามผิวหนัง
- เริ่มมีอาการของการติดเชื้อเริ่มที่ตา
- วิงเวียน
- มีการรับรสชาติที่ผิดปกติไป คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย ท้องเสีย ปากแห้ง
- ผมร่วง

**"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- หากยังไม่ได้เปิดใช้ ควรเก็บยานีไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง
- หลังจากเปิดใช้ครั้งแรกแล้ว ยานี้จะมีอายุ 28 วันและควรเก็บในตู้เย็นหรือที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** สารละลายใส ไม่มีสี
- **ตัวยาสำคัญ** ลาทาโนพรอสต์ และ ทีโมลอล
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์, ไตเบสึคโซเดียมฟอสเฟต, โมโนเบสึคโซเดียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต, เบนซาลโคเนียมคลอไรด์, โซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดไฮโดรคลอริก และน้ำ

ผู้ผลิต บริษัท Rafarm S.A., ประเทศกรีซ

ผู้นำเข้า บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 2 ก.พ. 2565

**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**