

**โรชัวสแตทิน
ความแรง 10 และ 20 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า Alvostat® (อัลโวสแตท)**

1. yanii คืออะไร

1.1 yanii ซึ่งว่าอะไร

- yanii ซึ่งว่า โรชัวสแตทิน (rosuvastatin) เป็นยาในกลุ่มลดไขมันในเลือด

1.2 yanii ใช้เพื่ออะไร

- yanii ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายเพื่อลดไขมันในเลือด และป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้yanii เมื่อไร

- เดย์แพยานี หรือส่วนประกอบของyanii หรือยาอื่นในกลุ่มสแตทิน เช่น ซิมัวสแตทิน อะทอร์วาสแตทิน
- ตั้งครรภ์ หรือ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือ ให้นมทารก
- เป็นโรคตับหรือโรคไตบกพร่องรุนแรง
- มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรงที่หาสาเหตุไม่ได้
- กำลังใช้ยาซึ่ง “ชิกโคลสปอร์вин”
“หากท่านไม่แน่ใจว่ามีอาการหรือใช้ยาใดอยู่โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้yanii ให้ปรึกษาแพทย์หรือ

เภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- เคยมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ หรือเคยมีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังจากใช้ยาลดไขมันชั่วโมง
- ตื่นแลกอหอล์บีร์มาณมากเป็นประจำ
- มีภาวะพrorong ไทรอยด์สอร์โนน (hypothyroidism)
- มีภาวะการหายใจลำบากเวรูนแรง
- กำลังใช้ยาตั้งต่อไปนี้
 - ยาลดไขมันในเลือดบางชนิด เช่น เฟโนไฟเบรต
 - ยาต้านเชื้อไวรัสโซเชิ่ลวีบางชนิด
 - ยาโคลชีซีน
 - ยาต้านเชื้อรานางชนิด เช่น ศีโตโคนาโซล อิทราโคนาโซล เป็นต้น
 - ยาฆ่าเชื้อบางชนิด เช่น อีริโตรไมซิน คลาริโตรไมซิน เป็นต้น
 - ยาเวยอรามิล ยาติลิไทอะเซน ยากรดนิโคทินิก ยาอะมิโอดารอน เพาะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อผิดปกติ หรือภาวะ กล้ามเนื้อลายสลาย
 - ติจ็อกซิน วอร์ฟาริน เนื่องจากจะดับยาเหล่านี้ในเลือดอาจสูงจนเกิดอันตรายได้
- การใช้yanii อาจเพิ่มความเสี่ยงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้
- อายุมากกว่า 70 ปี

“ส่วนความแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้yanii ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้yanii ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กิน yanii วันละ 1 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ โดยควรกินยาเวลาเดิมทุกวัน เพื่อช่วยให้ไม่ลืมกินยา
- ขนาดยาสูงสุดไม่เกินวันละ 40 มิลลิกรัม

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากเกิน 6 ชั่วโมง ให้รอกินยาอีกครั้ง
- ห้ามกินยาเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3 ถ้ากิน yanii เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง บลสภาวะสีเข้มผิดปกติ ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้yanii

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กิน yanii อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- คุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัย หรือยาคุมกำเนิด
- ควบคุมอาหารและออกกำลังกายระหว่างใช้yanii
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

- หากกินยาแล้วเวียนหัว ให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อ การพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกดتا ริมฝีปาก ลิมพิช
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่นพอง ผิวนังหลุดลอก มีจ้ำดามผิวนัง
- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรง หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ไม่ได้เกิดจากการออกกำลังกาย
“ให้หดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว เวียนหัว
- ปวดท้อง ท้องผูก

6. ควรเก็บยาไว้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

• ลักษณะยา

ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม กลมมนุน ทึ้งสองด้าน มี 2 ความแรง 10 มิลลิกรัม: สีชมพือ่อน ด้านหนึ่งมีตัวเลข “10” 20 มิลลิกรัม: สีชมพูเข้ม ด้านหนึ่งมีตัวเลข “20”
ตัวยาสำคัญ โรซูวาสเตติน (rosuvastatin)
ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ เซลลูโลส ไมโครคริสตัลลีน (cellulose microcrystalline) และโคลาโนโนไซเดรต (lactose monohydrate) クロสโพวิโดน (cross povidone) แมกนีเซียมสเตียเรต (magnesium stearate)

ผู้ผลิต Adamed Pharma S.A , Poland

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย)
จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อ.ย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th/>

