

ไฮดร็อกซีคาร์บาไมด์ ความแรง 500 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล ชื่อการค้า Hydrox-SP 500

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ไฮดร็อกซีคาร์บาไมด์ (hydroxycarbamide)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้ ได้แก่

- โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์
- โรคมะเร็งปากมดลูก

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ผู้ที่ประวัติว่ามีปัญหาโรคเลือด
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคเลือดจางชนิดรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ระวังการใช้ในผู้ที่เคยได้รับการรักษามะเร็งมาก่อน
 - ระวังการใช้ในผู้ที่มีปัญหาเรื่องตับหรือไต
 - ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคเกาต์
 - ระวังการใช้ในผู้ป่วยเอชไอวี
 - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่ขาดโฟลิก
 - ระวังการใช้ยานี้เมื่อเกิดแผลที่ผิวหนัง เช่นขา โดยไม่ทราบสาเหตุ
- ระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะมีลูก หรืออยู่ในระยะให้นมลูก เนื่องจากยาอาจผ่านน้ำนมสู่เด็กและเกิดอันตรายได้
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษา หรือเกิดอันตรายได้ เช่น การฉีดวัคซีนไวรัสเชื้อเป็น วัคซีนไวรัสโรตา ยารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี

3. วิธีการใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนยาทั้งเม็ด ไม่เปิด หัก หรือเคี้ยวเม็ดแคปซูล
- กินยาวันละครั้ง พร้อมน้ำสะอาดหนึ่งแก้ว

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยา ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- ดื่มน้ำมากๆ ในระหว่างที่รักษาด้วยยานี้
- หลีกเลี่ยงแสงแดด และปกป้องผิวจากแสงแดดเมื่อใช้ยานี้

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- มีไข้ หนาวสั่น ผิวหนังบวมแดง
- ตัวเหลือง ตาเหลือง มีแผลในปาก
- อุจจาระสีดำ มีเลือดปนมาในอุจจาระ
- ปวดหลังส่วนล่าง ปวดข้างลำตัว
- รู้สึกชา รู้สึกซ่าที่มือ หรือเท้า

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก ไม่สบายท้อง อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง
- ผื่นคัน ผื่นร่วง ผิวหนังลอก ผิวหนังฝ่อ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา

ผงยาสีขาวถึงสีขาวนวล บรรจุในแคปซูลชนิดเปลือกแข็ง

เบอร์ 0 ตัวแคปซูลสีชมพู ฝาแคปซูลสีเขียวอ่อน
ตัวยาสำคัญ ไฮดร็อกซีคาร์บาไมด์ 500 มิลลิกรัม

ส่วนประกอบอื่นๆ

แลคโตสโมโน ไฮดรต กรดซิตริก ไดโซเดียมฟอสเฟต
แมกนีเซียมสเตียเรต

ผู้ผลิต SP Accure Lab Pvt. Ltd.,
Plot No.12, Biotech Park Phase 2, Lalgadi Malakpet,
Shameerpet (M), Medchal Dist, Telangana, 500101, India

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท อีลลายนันซี ฟาร์มา จำกัด, ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 19 ตุลาคม 2565