

เอเซ็ททิไมบ์

ความแรง 10 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า EZET-10 (อีเซ็ท-10)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าเอเซ็ททิไมบ์ (Ezetimibe) มีตัวยา 10 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาลดไขมันในเลือด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เสริมการรักษา ร่วมกับการควบคุมอาหาร เพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่มีไขมันสูง ที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้
- ใช้ป้องกันภาวะเฉียบพลันที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่จะต้องใช้ยานี้ เช่น เส้นเลือดสมองแตก ปวดเค้นหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด เป็นต้น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยากดภูมิคุ้มกัน ถ้าตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร หรือเป็นโรคตับ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- ปวดหรือเจ็บกล้ามเนื้อ
- ผู้ที่มีภาวะการทำงานของตับบกพร่อง
- ผู้ที่ใช้ยาไซโคลสปอริน โคเลสเตรามิน ยาลดไขมัน กลุ่มไฟเบรท ยาด้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วอร์ฟาริน
- อายุน้อยกว่า 18 ปี

“หากมีภาวะดังกล่าว ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนใช้ยา”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้วันละ 1 ครั้ง โดยกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
- หากจำเป็นต้องใช้ยาร่วมกับยาโคเลสเตรามิน ให้กินยานี้ก่อนยาโคเลสเตรามินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงหรือหลังยาโคเลสเตรามินอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยา ให้รอกินยาในขนาดปกติในวันถัดไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็นสองเท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา และรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวน้ำพุตุลุดลอก มีจ้ำตามผิวน้ำพุตุลุดลอก หรือเลือดออกผิดปกติ
- ปวดหรือเจ็บกล้ามเนื้อ เกร็ง หรืออ่อนแรง โดยไม่ทราบสาเหตุ
- ปวดท้องร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียนและมีไข้
- แขนขาบวมผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องเสีย ท้องอืด รู้สึกเพลีย
 - ไอ อาหารไม่ย่อย ปวดตามข้อ ปวดคอ อากาอาหารน้อยลง ร้อนวูบวาบ
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา** เม็ดยาไม่เคลือบ สีขาวถึงครีม รูปทรงแคบซูล หน้าเม็ดยาเรียบ ขอบเว้า ด้านหนึ่งมีตัวอักษร ML อีกด้านหนึ่งเรียบ หน้าเม็ดยายาวประมาณ 8.15 มิลลิเมตร และกว้าง 4.05 มิลลิเมตร
- ตัวยาสัญญา** เอเซ็ททิไมบ์ 10 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ แลคโตส โมโนไฮเดรต, ครอสคาร์เมลโลส โซเดียม, โปวีโดน เค-30, โซเดียม ลอริล ซัลเฟต, น้ำกลั่นและแมกนีเซียม สเตียเรท

ผู้ผลิต บริษัท ไมโครแลป จำกัด ประเทศอินเดีย

ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่าย บริษัท วิวา เฮลท์แคร์ จำกัด ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กันยายน 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://www.fda.moph.go.th)

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Page/main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัย

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร