

ไอริโนทีแควไฮโดรคลอไรด์

ความแรง 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

สารละลายเข้มข้นเพื่อเจือจางสำหรับการหยดเข้าหลอดเลือดดำ

ชื่อการค้า Irnizet (ไอรินิเซท)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ไอริโนทีแควไฮโดรคลอไรด์ เป็นยาในกลุ่ม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้สำหรับการรักษาเดี่ยว หรือใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษา มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะลุกลาม ตามที่แพทย์วินิจฉัย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง ลำไส้อุดตัน
- หญิงให้นมบุตร
- โรคตับอักเสบรุนแรง
- โรคไตกระดูกล้มเหลวอย่างรุนแรง
- สภาพร่างกายอ่อนแอจนมีปัญหาคาการใช้ ชีวิตประจำวัน
- ห้ามใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของ เซนต์จอห์นเวิร์ต
- เพิ่งได้รับวัคซีนหรือกำลังจะฉีดวัคซีนชนิดเชื้อเป็น

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้

- ดับทำงานผิดปกติ หรือตัวเหลือง
- ไตทำงานผิดปกติ
- มีอาการหอบ หืด
- ได้รับการฉายรังสีมาก่อน
- มีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงพร้อมมีไข้ หลังจากได้รับยาไอริโนทีแควมาก่อน
- มีโรคหัวใจ
- ตั้งท้องหรือวางแผนจะตั้งท้อง
- ผู้สูงอายุ มีความดันเลือดสูง มีคลอเลสเตอรอลสูง
- ได้รับ ยา หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่น ๆ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ โดยแพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน

3.2 หากว่าลืมฉีดยา ยาควรทำอย่างไร

- แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร หากท่านลืมรับยาหรือไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัดหมาย

3.3 หากฉีดยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์ หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติหลังจากฉีดยา

- พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
- ควรคุมกำเนิดทั้งผู้ป่วยหญิงและผู้ป่วยชาย ในระหว่างการรักษา และ หลังจากที่ยุติการรักษาแล้ว ให้คุมกำเนิดต่ออีก อย่างน้อย 6 เดือน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มน้ำพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- อาการท้องเสีย
- มีไข้ หนาวสั่น ปวดท้อง

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ทันที

- ผมร่วง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร มีแผลในปาก ท้องผูก มีผื่น ตะคริว ความดันโลหิตสูง
- คลื่นไส้ อาเจียน

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบยานี้

- **ลักษณะยา** สารละลายใส ไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน
- **ตัวยาสัญญา** ไอริโนทีแควไฮโดรคลอไรด์
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่** ซอร์บิทอล กรดแลคติก โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดไฮโดรคลอริก น้ำ

ผู้ผลิต: Eugia Pharma Specialities Limited, Survey No. 550,551 & 552, Kolthur Village, Shameerpet Mandal, Medchal-Malkajgiri District, Telangana, India.

ผู้นำเข้า: บริษัท เอพีแอล ฟาร์มาไทย จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
25 มกราคม 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อหากมี
ข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร