

ไรโบซิคลิบ

200 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด Kisqali (คิสคาลี)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า ไรโบซิคลิบ ซักซิเนต (ribociclib succinate) เป็นยาต้านมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมชนิดที่แพทย์ตรวจแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้ โดยต้องให้ยานี้ร่วมกับยาต้านมะเร็งชนิดอื่นอีก ได้แก่ ยายับยั้งเอนไซม์อะโรมาเตส หรือ ยาฟูลเวสแทรนต์ (fulvestrant)

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยา
- แพ้ถั่วเหลือง หรือ ถั่วลิสง
- เมื่อตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

แจ้งแพทย์ เภสัชกรก่อนเริ่มใช้ยา หากท่าน

- มีไข้ เจ็บคอ มีแผลในปาก ที่เกิดจากการติดเชื้อ เพราะท่านอาจมีเม็ดเลือดขาวต่ำ
- มีปัญหาที่ตับหรือเคยเป็นโรคตับ
- หัวใจทำงานผิดปกติ หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ
- เลือดมีโพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม หรือ ฟอสฟอรัส ต่ำกว่าค่าปกติ
- แจ้งรายชื่อยา อาหารเสริมหรือสมุนไพร ที่กำลังใช้อยู่ เพราะอาจส่งผลต่อการรักษาของยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- แพทย์จะแจ้งท่านว่ากินยาวันละกี่เม็ด
- โดยทั่วไป จะให้กิน วันละ 1 ครั้ง ในตอนเช้า โดยควรเป็นเวลาเดิมทุกวัน กินได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร
- กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามบด แบ่ง เม็ดยา
- กินติดต่อกัน 21 วัน แล้วหยุดยา 7 วัน จึงจะครบหนึ่งรอบของการรักษา 28 วัน
- บนข้างกล่องมีปฏิทินสำหรับจัดการกินยา ให้ท่านทำเครื่องหมายในวงกลมทุกครั้งที่ยากินยาแต่ละเม็ด

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาหรืออาเจียนหลังกินยา ให้รอกินยาในวันถัดไปของเวลาเดียวกัน ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที โดยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และให้นำชื่อยาไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ไม่ควรกินผลและน้ำเกรปฟรุต เพราะอาจทำให้ปริมาณยาคิสคาลีในเลือดสูงเกินไปได้
- เพิ่มความระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

- หากท่านมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ ท่านต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีที่ได้ผลแน่นอนในระหว่างที่ใช้ยานี้ และต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 21 วัน หลังจากหยุดยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกติ
- มีไข้ เหงื่อออกมาก หรือ หนาวสั่น อ่อนเพลีย มีอาการที่เกิดจากการติดเชื้ออยู่บ่อยครั้ง เช่น เจ็บคอ มีแผลในปาก
- อ่อนล้า ตัวเหลือง ตาเหลือง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ปวดท้องบริเวณด้านขวาเหนือสะดือ ปัสสาวะมีสีเข้มหรือสีน้ำตาล
- เจ็บหรือแน่นหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว หรือ ช้ำผิปกติ ใจสั่น เวียนหัว เป็นลม ปากคล้ำม่วง หายใจถี่ ขาบวม
- มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ไอ เสมหะมีเลือดปน ปวดตัว

"ต้องหยุดยารรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องผูก
- เบื่ออาหาร การรับรสผิดปกติ ท้องอืด อาหารไม่ย่อย แสบร้อนกลางอก
- ผื่น คัน ผิวหนังร่อนแดง เยื่อช่อง-ปากอักเสบ ปากแห้ง ผิวแห้ง เกิดรอยต่างขา
- เหนื่อยหรือผิวซีด เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย วิงเวียน ผม่ว่ง หายใจไม่อิ่ม
- ปวดหลัง ปวดหัว มีบวม เท้าบวม ตะคริว
- น้ำตาไหลมาก ตาแห้ง
- ปัสสาวะแสบขัดและปัสสาวะบ่อย มีไข้

- คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ จาม รู้สึกแน่น หรือ ปวดที่แก้ม หรือ หน้าผาก โดยอาจมีไข้ร่วมด้วย เสียงแหบ ไม่มีเสียง

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ควรไปพบแพทย์”

อาจมีอาการไม่พึงประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้เกิดขึ้นได้ หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุบนกล่อง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้นำเข้า บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ โทร. 0-2080-0999

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2561

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**