

## “โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนใช้”

เลโวเนอร์เจสเตอร์ล  
ความแรง 0.75 มิลลิกรัม  
ชนิดเม็ด  
ชื่อการค้า GINNY (จีนี่)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เลโวเนอร์เจสเตอร์ล (Levonorgestrel) มีตัวยา 0.75 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่ม ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้ป้องกันการตั้งครรภ์ในกรณี

- ผู้ที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา
- การใช้วิธีคุมกำเนิดปกติผิดพลาด ไม่ถูกต้อง หรือมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ถุงยางอนามัยย้วยแตก นับระยะปลอดภัยผิด ห่วงอนามัยหลุด ลืมฉีดยาคุมกำเนิด หรือลืมรับประทานยาคุมกำเนิดเกิน 3 วัน

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ใช้เพื่อคุมกำเนิดแบบปกติ
- หญิงตั้งครรภ์
- มีเลือดออกในช่องคลอด

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่
  - มีภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือระบบทางเดินอาหารไม่สามารถดูดซึมได้ปกติ
  - เป็นโรคตับ หรือตับทำงานผิดปกติ
  - เคยมีประวัติท้องนอกมดลูก
  - เป็นหรือเคยเป็นปีกมดลูกอักเสบ
- ไม่ใช้ยานี้สำหรับป้องกันการตั้งครรภ์เป็นประจำ หากใช้ซ้ำหลายครั้ง อาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้
- ยานี้ใช้ทำแท้งไม่ได้ผล และไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยา 1 เม็ด ภายใน 24 ชั่วโมง แต่ไม่นานเกินกว่า 72 ชั่วโมง ภายหลังจากมีเพศสัมพันธ์ และต้องกินซ้ำอีก 1 เม็ด หลังรับประทานเม็ดแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมง

#### 3.2 ถ้า กิน ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีเลือดคล้ายประจำเดือน ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- กินยาหลังการมีเพศสัมพันธ์ทันที สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้
- ถ้าอาเจียนภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากกินยา ควรกินยาใหม่อีกครั้งทันที
- ถึงแม้จะใช้ยาอย่างถูกต้อง ก็อาจตั้งครรภ์ได้

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ประจำเดือนขาด
- เลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว เวียนหัว
- ปวดประจำเดือนผิดปกติ ประจำเดือนเลื่อน
- คลื่นไส้ ไม่สบายท้อง อาเจียน
- คัดตึงเต้านม เต้านมบวม เจ็บเต้านม

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เม็ดกลมแบนสีขาว บรรจุแผงละ 2 เม็ด
- ตัวยาสาคัญ เลโวเนอร์เจสเตอร์ล
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ โพวิโดน (พีวีพี เค 90), 95% แอลกอฮอล์ (เอทานอล), คอร์น สตาร์ช, แลคโตส โมโนไฮเดรต, คอล-ลอย-ดอล ซิลิกอน ไดออกไซด์, ทัลก์, แมกนีเซียม สเตียเรต

ผู้ผลิต บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 26 เมษายน 2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx)

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร