

เบนดามัสติน

ความแรง 2.5 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร
ชนิดผงสำหรับผสมน้ำเพื่อฉีด
ชื่อการค้า Bendastin (เบนดัสติน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า เบน-ดา-มัส-ติน-ไฮ-โดร-คลอ-ไรด์ (Bendamustine Hydrohydrochloride)
- เป็นยาในกลุ่ม ยารักษาโรคมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟโซดแบบเรื้อรัง
- รักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ อยู่ระหว่างการให้นมบุตร
- ⊗ การทำงานของตับบกพร่องอย่างรุนแรง
- ⊗ มีโรคไตขั้น หรือ ตัวเหลือง ตาเหลือง ซึ่งเป็นอาการของโรคไตขั้น
- ⊗ การทำงานของไขกระดูกผิดปกติอย่างรุนแรง
- ⊗ เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ในช่วง 30 วันก่อนการได้รับยา
- ⊗ มีโรคติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเม็ดเลือดขาวมีระดับน้อยกว่าปกติ
- ⊗ เพิ่งได้การฉีดวัคซีนไขเหลือง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์เมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีโรคหัวใจ
 - มีอาการปวดศีรษะ ปัสสาวะน้อยลง หรือปัสสาวะมากขึ้นผิดปกติ หรือมีเลือดปนออกมากับปัสสาวะ
 - ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่ ตั้งครรภ์ หรือวางแผนตั้งครรภ์
- “สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร**
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

เท่านั้น

- ยานี้ใช้สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดเท่านั้น
- การฉีดยาแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลา 30-60 นาที
- ขนาดยาขึ้นอยู่กับชนิดของโรคมะเร็ง และขนาดร่างกายของผู้ป่วย
- ระยะเวลาในการรักษาขึ้นกับชนิดของโรคมะเร็ง และการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- ควรติดต่อแพทย์เพื่อทำการนัดหมายการฉีดยาครั้งต่อไป

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบแจ้งแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
- ห้ามหยุดการรักษาด้วยตัวเอง
- ต้องคุมกำเนิดก่อนใช้ยา และระหว่างการใช้ยานี้
- ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจจำนวนเม็ดเลือด ก่อนการเริ่มใช้ยา และระหว่างการรักษา
- หลังใช้ยา อาจมีอาการมึนงงได้ ไม่ควรขับรถ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
- สังเกตอาการที่เกิดขึ้นหลังฉีดยา โดยเฉพาะการฉีดยาครั้งแรก เพื่อเฝ้าระวังการแพ้ยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีปัญหาเกี่ยวกับความคิด ความทรงจำ หรือการมองเห็นผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นอาการของการติดเชื้อในสมอง
- ผิวหนังเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเป็นอาการเบื้องต้นของมะเร็งผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์

- มีไข้ ปวดหัว เวียนหัว อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน
- ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น

- หน้ามืด ใจสั่น
 - ประจำเดือนมาผิดปกติ
 - มีแผลในปาก
 - ท้องเสีย ท้องผูก
 - ผม่วง มีผื่นคัน
 - เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ หายใจได้ไม่เต็มที่
- “เป็นอาการที่ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ ยกเว้นถ้ามีอาการรุนแรง”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียสในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ยาที่ผสมน้ำแล้ว จะมีอายุ 3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง และมีอายุ 24 ชั่วโมง ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็น

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ผงสีขาวถึงสีขาวนวล
- **ตัวยาสำคัญ** เบนดามัสตินไฮโดรคลอไรด์ 25 มิลลิกรัม และ 100 มิลลิกรัม ต่อ 1 ขวดแก้ว
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ แมนนิทอล (Mannitol)
- **ผู้ผลิต** บริษัท หานนกวง ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ประเทศไทยได้หวัน
- **ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย** บริษัท ชิมเจนส์ จำกัด เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 9 กรกฎาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น