

ดาซาทีนิบ
ความแรง 20,50,70 และ 100 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า DASATINIB TEVA
(ดาซาทีนิบ เทวา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ดาซาทีนิบ (Dasatinib)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งแพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

X ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

X ห้ามใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
 - กำลังใช้ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด
 - เคยเป็น หรือกำลังเป็นโรคตับ
 - เคยเป็น หรือกำลังเป็นโรคหัวใจ
 - เคยเป็น หรือกำลังติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบชนิดบี
 - กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนที่จะมีลูก
 - กำลังให้นมลูก
 - ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
- กินยาเวลาเดียวกันทุกวัน
- กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามบด ตัด หรือเคี้ยวยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

ให้รอกินยาเวลาเดิมในวันถัดไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- อย่ากินยาลดกรด 2 ชั่วโมงก่อน หรือ 2 ชั่วโมงหลังกินยานี้
- อย่ากินเกรปฟรุตหรือน้ำเกรปฟรุตระหว่างที่ใช้ยานี้ เพราะอาจเกิดอันตรายเพิ่มขึ้นจากยาได้
- ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์และผู้ชายที่ได้รับยานี้ต้องคุมกำเนิด ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการรักษา
- ผู้หญิงที่กำลังให้นมลูก ต้องงดให้นมลูกตลอดระยะเวลาการรักษา
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูงเพราะยานี้อาจทำให้เวียนหัว ตาพร่าได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- เจ็บหน้าอก ใจสั่น ไอ
- อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด อุจจาระสีดำ
- ใช้ หนาวสั่นรุนแรง เจ็บปากหรือคอ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
- ปวดหัว รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนแรง
- ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง
- เริ่ม งูสวัด หรืออีสุกอีใส
- การรับรสเปลี่ยนไป มีแผลในปาก ท้องอืด ท้องผูก
- น้ำหนักเพิ่มขึ้น หรือลดลง
- คั้นผิวหนัง ผิวแห้ง สิว ผมร่วง ตาแห้ง ตาพร่า

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เป็นเม็ดเคลือบฟิล์มสีขาวถึงสีขาวนวล บรรจุในขวดพลาสติก มี 4 ความแรง ได้แก่
 - **ความแรง 20 มิลลิกรัม** เป็นเม็ดกลม ขอบเอียง ด้านหนึ่งมีตัวเลข "20"
 - **ความแรง 50 มิลลิกรัม** เป็นเม็ดรี ขอบเอียง ด้านหนึ่งมีตัวเลข "50"
 - **ความแรง 70 มิลลิกรัม** เป็นเม็ดกลม ขอบเอียง ด้านหนึ่งมีตัวเลข "70"
 - **ความแรง 100 มิลลิกรัม** เป็นเม็ดรี ขอบเอียง ด้านหนึ่งมีตัวเลข "100"
- **ตัวยาสำคัญ** ดาซาทีนิบ
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ แลคโตสโมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส, ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส, ครอสคาลเมลโลส โขเดียม, แมกนีเซียมสเตียเรต, โอปราดรายไวท์

ผู้ผลิต บริษัท พลิวา โครเอเชีย จำกัด, ประเทศโครเอเชีย
ผู้นำเข้า บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด,
กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 เมษายน 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**