

เพมีเทรกเซด
ความแรง 25 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร
ชนิดยาฉีด
ชื่อการค้า Pexeda (พีซีดา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เพมีเทรกเซด (pemetrexed) เป็นยาต้านมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด หลังแพทย์ตรวจรักษาแล้วเห็นว่าต้องใช้อย่างนี้
- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต หรือมะเร็งปอดชนิดไม่ใช้เซลล์เล็ก หลังแพทย์ตรวจรักษาแล้วเห็นว่าต้องใช้อย่างนี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เมื่อได้รับหรือกำลังจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคไขเหลือง
- ⊗ เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาในกลุ่มกรดโฟลิก
- ⊗ เมื่ออยู่ในระยะให้นมลูก เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อเด็ก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีภาวะโรคตับ ไต หัวใจ หรือน้ำท่วมปอด
- กำลังหรืออยู่ระหว่างการฉายรังสี
- กำลังกินหรือฉีดยาแก้ปวด อักเสบ หรือฉีดวัคซีน
- ผู้หญิงที่วางแผนมีลูก กำลังตั้งท้องหรืออยู่ในระยะให้นมลูก เพราะยาทำให้เกิดอันตรายต่อเด็ก
- ผู้ชายที่ต้องการมีลูก เพราะยาอาจทำให้มีลูกยาก
- หากคุณต้องขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร

3. วิธีการใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมมาฉีดยา ควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น มีไข้ ท้องเสีย มีแผลในปาก เลือดออกและหยุดยาก อาการคันหรือตุ่มพอง หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับขี้นานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัด ตกจากที่สูง
- แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลว่ากำลังใช้อย่างนี้
- ห้ามฉีดวัคซีนป้องกันไขเหลือง กรณีจำเป็นต้องฉีดวัคซีน ให้ใช้วัคซีนชนิดเชื้อตาย
- ระหว่างใช้ยานี้ ผู้หญิงต้องคุมกำเนิดและหยุดให้นมลูก

ผู้ผลิต TTY Biopharm Co., Ltd. Chungli Factory, 838, Chung Hwa Rd., Sec. 1., Chungli Dist., Taoyuan City., 32069, Taiwan R.O.C.

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท พาโนริส ฟาร์มา จำกัด

เลขที่ 18/127 หมู่บ้านเดอะเทอเรซ ซอยรามอินทรา 65

ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทรศัพท์ 02-509-6466

เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกร**

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ไอแบบมีเสมหะเป็นเลือด
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกัด
 - มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส เหงื่อออก หนาวสั่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ
 - มีอาการเลือดออกจากเหงือก ปาก จมูก จ้ำเลือดที่ผิวหนัง บัสสาวะสีแดงหรือชมพู
 - หยุดหายใจชั่วคราว เจ็บหน้าอก ไอมีเสมหะปนเลือด
 - รู้สึกอ่อนล้า รู้สึกหิวๆ เหมือนใจจะขาด หน้าซีด
- “หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล

- คลื่นไส้ อาเจียน คออักเสบ ท้องร่วง ท้องผูก
- ปวดท้อง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
- ผมร่วง การรับรสเปลี่ยนไป

“หากมีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- เก็บยาไว้ใน บรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยานี้ไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง
- กรณีผสมยาแล้ว ใช้ยาหลังผสมทันที หากไม่ใช้ทันทีสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ได้ไม่เกิน 36 ชั่วโมง

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

พีซีดา 25 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร เป็นสารละลายใส ไม่มีสีจนถึงสีเหลืองหรือสีเหลืองออกเขียว พีซีดาประกอบด้วย ตัวยาเพมีเทรกเซด แมนนิทอล โซเดียมคลอไรด์ และน้ำสำหรับยาฉีด