

**ลอร์ลาทินิบ
ความแรง 25 และ 100 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า LORVIQUA™ (ลอร์วิคัว™)**

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ลอร์ลาทินิบ (lorlatinib)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งปอดที่มีการแพร่กระจายในผู้ใหญ่ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยาเมื่อไร

⊗ เดย์แพพยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

⊗ ห้ามใช้ยาเมื่อร่วมกับ ไฮแฟมพิชิน คาร์บามาเซพิน เพนโทอิน, เอนชาลูตาไมด์, ไมโทเทน, สมุนไพรเขนต์ จอห์นเวิร์ท

“หากไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาดังกล่าวหรือไม่
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

• ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- มีคอลเลสเตอรอล หรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง
- แพทย์แจ้งว่ามีอะไรในเลสหรือไอลิปส์ในเลือดสูง
- เดย์กินยาเมื่อวันก่อนยาการเจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ไอทั้งแบบมีเสมหะและไม่มีเสมหะ
- กำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก
- กำลังใช้ยาอื่น อาหารเสริม หรือสมุนไพรอยู่
- มีปัญหาเกี่ยวกับไต

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาเมื่อร่วมกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาเมื่อก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
- ควรกินยาเวลาเดินทุกวัน
- อย่า** เคี้ยว บด หรือ แบ่งเม็ดยา ก่อนกิน
- อย่ากินยาเมื่ออาหารหัก แตก หรือไม่สมบูรณ์

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่ทันได้ แต่ถ้าใกล้เวลาครั้งถัดไป ให้รอ กินยาเมื่อถัดไปตามปกติ ห้ามเพิ่มยาเป็นสองเท่า
- หากอาเจียนหลังกินยา อย่ากินยาเพิ่ม ให้รอ กินยาครั้งถัดไปตามปกติ

3.3 ถ้ากินยาแล้วเกินขนาดที่แนะนำ ควร怎么办

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที และนำกล่องยาไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- อย่าหยุดยาเอง และให้กินยาเมื่อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงการขับรถ หรือการทำงานกับเครื่องจักรกล เพราะยาเมื่อจัดตั้งจะทำให้ควบคุมเครื่องจักรได้ลดลง
- หลีกเลี่ยงให้นมลูกในระหว่างการใช้ยา และนับไปอีกอย่างน้อย 7 วัน หลังการหยุดยา
- หลีกเลี่ยงต้องคุยกับนิติธรรมหรือแพทย์ ยาเมื่อย่างน้อย 35 วัน ช่วยต้องคุยกับนิติธรรมหรือยาเมื่อยังน้อย 98 วัน เพราะยาเมื่ออาจเป็นอันตรายต่อทารก
- ให้คุณกำเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัย เพราะยาเมื่อทำให้ยาคุณกำเนิดชนิดกินและฉีดได้ผลลดลง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกด้า ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่นพอง ผิวนังหลุดลอก มีจ้ำดามผิวนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- หัวใจเต้นช้าหรือเร็วผิดปกติ ปวดหัว เวียนหัว เป็นลม หายใจถี่ พูดลำบาก พูดช้า
- ซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด ก้าวร้าว วิตกังวล สับสน หลงลืม มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิต สูญเสียการติดต่อกับความเป็นจริง เช่น มีความเชื่อ เห็น ได้ยินในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง

- ปวดห้อง ปวดหลัง ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม คลื่นไส้ อาเจียน เปื่อยอาหาร
- ไอ เจ็บหน้าอัก มีปัญหาในการหายใจ “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- แขนขาบวม เป็นเห็นบ้า ห้องเสีย ห้องผูก
- น้ำหนักซึ้น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ

6. ควรเก็บยาเมื่อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงแดดตรง โดยหัวไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะของยาและตัวยาสำคัญ ยาเมื่อตัวยาสำคัญ ลอร์ลาทินิบ (lorlatinib) มี 2 ความแรง ดังนี้
 - เม็ดเคลือบฟิล์มสีชมพูอ่อน กลม ด้านหนึ่งมีอักษร “Pfizer” อีกด้านหนึ่งมีอักษร “25” และ “LLN” มีตัวยา **25 มิลลิกรัม**
 - เม็ดเคลือบฟิล์มสีชมพูเข้ม รูปไข่ ด้านหนึ่งมีอักษร “Pfizer” อีกด้านหนึ่งมีอักษร “LLN 100” มีตัวยา **100 มิลลิกรัม**
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ไมโครคริสตัลลีน เชลลูลอล, แคลเซียมไอกไซด์เจนฟอสเฟต, โซเดียมสตีเรียเรต แมกนีเซียมสเตรียเรต

ผู้ผลิต Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
ผู้นำเข้า Pfizer (Thailand) Limited

ผู้แทนจำหน่าย Zuellig Pharma LTD.

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 18 มีนาคม 2564

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของอย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือน: ยาเมื่ออาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร