

**เอสซิดาโลแพรม
10, 15 และ 20 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ESLOPRAM
(เอซโลแพรม)**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เอซโลแพรม (Eslopram) มีตัวยาเอสซิดาโลแพรม ออกซาเลต เทียบเท่ากับ เอสซิดาโลแพรม 10, 15, หรือ 20 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคซึมเศร้า
- ใช้รักษาโรคตื่นตระหนกที่มีหรือไม่มีอาการกลัวที่ชุมชน
- ใช้รักษาโรควิตกในการเข้าสังคม (โรคกลัวสังคม)
- ใช้รักษาโรควิตกกังวลทั่วไป
- ใช้รักษาโรคย้ำคิดย้ำทำ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ยานี้ หากตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- ผู้ป่วยโรคตับหรือโรคไต
- ผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาโรคซึมเศร้าบางกลุ่ม หรือยารักษาโรคจิตเวชบางตัว เช่น pimozide
- ผู้ป่วยสูงอายุ วัยรุ่น (อายุต่ำกว่า 18 ปี) หรือเด็ก

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะ ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาให้กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้ถึงเวลา กินยาของมื้อถัดไป ให้ออกไปกินมื้อถัดไปเลย และห้ามเพิ่มยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชัก หหมดสติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง หากรับประทานยาอื่นๆ อาหารเสริม หรือสมุนไพรร่วมด้วย
- ควรรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามขนาดยาที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ ไม่ควรเพิ่มหรือลดขนาดยาเอง
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หากรับประทานยานี้แล้วง่วงนอน วิงเวียน ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผื่นผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ท้องเสีย
- กังวล กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ ผื่นร้าย
- ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ มีเหงื่อออกมากผิดปกติ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา :** เม็ดรูปรี เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่งและตัวเลข 10 อีกด้านหนึ่งเรียบ
- ตัวยาสำคัญ :** เอสซิดาโลแพรม ออกซาเลต
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ :** ซิลิซิไฟต์ไมโครคริสทัลไลน์เซลลูโลส, คลอสคาร์เมลโลสโซเดียม, ทัลคัม, แมกนีเซียม สเตียเรต, โอปาตราย ไวท์, น้ำกลั่น, ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์

ผู้ผลิต: บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด

1/18 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทร. 0-2157-1111 แฟกซ์ 0-2943-5038

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: กุมภาพันธ์ 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>