

## อิมาทินิบ

ความแรง 100, 400 มิลลิกรัม

## ชนิดเม็ด

IMATINIB 100 EURODRUG

IMATINIB 400 EURODRUG

(อิมาทินิบ 100 ยูโรดรัก)

อิมาทินิบ 400 ยูโรดรัก)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า อิมาทินิบ เมสิเลท (Imatinib mesilate)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด, มะเร็งของกระเพาะอาหารและลำไส้ และมะเร็งผิวหนัง ซึ่งแพทย์ต้องตรวจแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ ห้ามใช้หากเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์ก่อนใช้ยา หากเป็นผู้มีหรือเคยมีปัญหาที่ตับ ไต หรือหัวใจ
- แจ้งแพทย์ก่อนใช้ยา หากได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกและกำลังรับยา ลีโวไทรอกซิน (Levothyroxine)
- แจ้งแพทย์ก่อนใช้ยา หากมีหรือเคยมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เพราะอาจทำให้โรคตับอักเสบบีกำเริบ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้
- แจ้งแพทย์หากท่านกำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หากท่านใช้ยาอื่นๆ อาหารเสริมหรือสมุนไพร เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของยานี้

## 3. วิธีการใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร อย่างเคร่งครัด เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค จึงควรกินยาตามแพทย์สั่ง
- กินยาทั้งเม็ดพร้อมอาหาร หรือหลังอาหารทันที แล้วดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะและลำไส้
- หากกลืนยาไม่ได้ ให้ละลายเม็ดยาในน้ำเปล่าหรือน้ำแอปเปิ้ล และดื่มให้หมดทันที
- ยาขนาด 100 มิลลิกรัม ละลายในน้ำ 50 มิลลิลิตร

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาแล้วนึกออกภายใน 6 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมกินยาเกิน 6 ชั่วโมง ไม่ต้องกินยามื้อนั้น ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง ท้องเสียรุนแรง ปวดท้องรุนแรง ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที และนำยาไปด้วย

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- สวมเสื้อผ้าให้มิดชิดและทาครีมกันแดดที่มีสาร SPF เพราะยานี้อาจทำให้ผิวหนังไวต่อแสงแดดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
- ห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับขี่ยานพาหนะ การทำงานกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้วังงเวียน ตาพร่ามัว

**คำเตือน : ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น**

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ไอ เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก หรือรู้สึกเจ็บขณะหายใจ
- อาการของภาวะหัวใจล้มเหลว เช่น เหนื่อยขณะออกกำลังกายหรือขณะนอนราบ หัวใจเต้นเร็ว ตัวบวม
- เลือดออกในทางเดินอาหาร ดูได้จากมีอาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นสีดำ

### “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
- ปวดกล้ามเนื้อ ตะคริว เป็นผื่นแดง
- บวม น้ำหนักขึ้น

### “ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุบนกล่อง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** เป็นยาเม็ดยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีเหลืองเข้มถึงน้ำตาลส้ม รูปร่างกลม
- ตัวยาสาคัญ** อิมาทินิบ เมสิเลท เทียบเท่าอิมาทินิบ 100 และ 400 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส, ไฮดรอกซีโพรพิล เซลลูโลสที่มีหมู่แทนที่ต่ำ, โพรโตน, คอสโพรโพรโตน ชนิดเอ, ซิลิกา คอลลอยดอล แอนไฮดรัส, แมกนีเซียมสเตียเรต, ไฮโพรเมลโลส, แมกโครกอล 400, ทาล, เรด ไอรอน ออกไซด์, เยลโลว์ ไอรอน ออกไซด์

ผู้ผลิต : Remedica Ltd, ประเทศไอร์แลนด์

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย :

บริษัท แชนิฟิด เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 26 ตุลาคม 2564

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>