

โมเมทาโซน
ความแรง 50 ไมโครกรัมต่อ 1 กด
ชนิดพ่นจมูก
ชื่อการค้า Momensa (โมเมนซ่า)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โมเมทาโซนฟูโรเอท (mometasone furoate) เป็นยาในกลุ่มสเตอรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้บรรเทาอาการโพรงจมูกอักเสบ คัดแน่นจมูก น้ำมูกไหลจากภูมิแพ้ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
- ยานี้ใช้รักษาอาการริดสีดวงจมูกในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มสเตอรอยด์
- มีการติดเชื้อที่จมูก เพราะยานี้อาจทำให้อาการที่เป็นอยู่แย่ลง
- ได้รับการผ่าตัดบริเวณจมูกหรือมีบาดแผลในจมูก ควรรอจนแผลหายดี จึงใช้ยานี้ได้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นวัณโรค
 - เป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น เอชไอวี
 - ใช้ยาสเตอรอยด์ ทั้งแบบฉีดหรือกิน
- เด็ก ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกินกว่าแพทย์สั่ง


- หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้


- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

ก่อนพ่น



- กำจัดน้ำมูกออกจากจมูกให้หมด (ถ้ามี)
- เชยขาขวา (ถ้าใช้ครั้งแรกให้บีบลมออกก่อน จนได้ละอองฝอย) ตามรูป

ขณะพ่น



- เปิดฝาขวดยาออกแล้วสอดปลายที่พ่นยาเข้าไปในรูจมูก
- กดที่พ่นยาเข้าจมูก ให้ปลายหลอดพ่นชี้ไปทางผนังด้านข้างโพรงจมูกให้มากที่สุด ตามรูป

- ห้ามพ่นยาไปที่ผนังกันจมูกเพราะจะทำให้เป็นแผลและมีเลือดกำเดาไหล
- พ่นยาในรูจมูกอีกข้างด้วยวิธีเดียวกัน
- ถ้าต้องพ่นข้างละ 2 ครั้ง ควรพ่นข้างละ 1 ครั้ง ให้ครบทั้ง 2 ข้างก่อน แล้วจึงเริ่มพ่นครั้งที่ 2 ให้ครบทั้ง 2 ข้าง

หลังพ่น

- เช็ดทำความสะอาดที่ปลายพ่น ปิดฝาเก็บให้เรียบร้อย

3.2 หากลืมพ่นยาควรทำอย่างไร

- ให้พ่นยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้กับการใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปโดยไม่ต้องพ่นยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าพ่นยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- อย่าอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ เป็นโรคหัด โรคอีสุกอีใส เพราะอาจติดโรคได้ง่าย
- ควรแจ้งแพทย์ หาก
 - เป็นโรคติดเชื้อที่คอหรือจมูก
 - ต้องใช้ยาอื่นเป็นระยะเวลานาน
 - มีอาการระคายเคืองที่จมูกหรือคออย่างต่อเนื่อง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- กลืนอาหารลำบาก

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว จาม เลือดกำเดาไหล เจ็บจมูกหรือคอ
- เป็นแผลในจมูก ติดเชื้อทางเดินหายใจ ตาพร่ามัว ลื่นรับรสไม่ได้ จมูกไม่ได้กลิ่น

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็ง
- ห้ามรับประทานหากอายุ หรือครบ 2 เดือนนับตั้งแต่เปิดขวดยา
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา:** ยานี้เป็นยาน้ำแขวนตะกอนลักษณะสีขาวถึงสีขาวออกเหลืองสำหรับพ่นจมูก
- **ตัวยาสำคัญ:** โมเมทาโซน ฟลูโรเอท (mometasone furoate)
- **ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่:** benzalkonium chloride (เบนซอลโคนเนียมคลอไรด์), glycerol (กลีเซอรอล), polysorbate 80 (โพลีซอร์เบท 80), microcrystalline cellulose (ไมโครคริสทัลลีนเซลลูโลส), carmellose sodium (คาร์เมลโลสโซเดียม), citric acid monohydrate (ซิตรีคแอซิดโมโนไฮเดรต), sodium citrate (โซเดียมซิเตรต), น้ำ (purified water)

ผู้ผลิต: Farmea ประเทศฝรั่งเศส

ผู้นำเข้า: บริษัท อัลโวเจน(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท อัลโวเจน(ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2563

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**