

**อะดาลิมเมบ (Adalimumab)
40 มิลลิกรัม/0.8 มิลลิลิตร
สารละลายสำหรับฉีด
บรรจุในกระบอกฉีดยาบรรจุ
เซรีส/ปากกาฉีดยาบรรจุเซรีส
ชื่อการค้า ABRILADA™
(อะบรีลาดา™)**

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า “อะบรีลาดา” (ABRILADA) ชื่อ
สามัญทางยาคือ “อะดาลิมเมบ
(adalimumab)” มีตัวยาอะดาลิมเมบ 40
มิลลิกรัม/0.8 มิลลิลิตร เป็นยากลุ่มที่เอ็น
เอฟ อัลฟ่า บล็อกเกอร์ (TNFα blockers)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

อะบรีลาดาใช้เพื่อรักษาโรคที่เกิดจากการ
อักเสบต่าง ๆ ต่อไปนี้:

- โรคข้ออักเสบเรื้อรังแบบอยู่ดี
- โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก
- โรคข้ออักเสบหล่ายต่ำแห่งที่ไม่ทราบ
สาเหตุในเด็ก

- โรคข้ออักเสบในต่ำแห่งที่เส้นเอ็นไป
ทางกับกระดูก
- โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด
- โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบโดยไม่มี
หลักฐานจากภาพถ่ายรังสีว่าเป็นโรคข้อ
กระดูกสันหลังอักเสบยึดติด
- โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน
- โรคสะเก็ดเงิน
- โรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาในเด็ก
- โรคต่อมเหงื่ออักเสบเป็นหนอง
- โรคคอร์ห์น
- โรคลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดเป็นแผล
- โรคมานตาอักเสบชนิดไม่ติดต่อ

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เด็กแพ้อดาลิมเมบหรือส่วนประกอบ
ของยานี้ (แสดงไว้ในหัวข้อที่ 7)
- หากคุณมีการติดเชื้อรุนแรง ซึ่งรวมถึงวัณ
โรคระยะแสดงอาการ ภาวะพิษเหตุติด
เชื้อ (ภาวะโลหิตเป็นพิษ) หรือการติด
เชื้อจุลทรรศน์ (การติดเชื้อที่ผิดปกติซึ่ง
สัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ) คุณ

ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีอาการ
ของ การติดเชื้อ ตัวอย่างเช่น มีไข้
บาดแผล รู้สึกเหนื่อย ปัญหาเกี่ยวกับฟัน
นี่ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

- หากคุณมีภาวะหัวใจวายปานกลางหรือ
รุนแรง คุณต้องแจ้งให้แพทย์ทราบหาก
คุณเคยมีหรือมีอาการทางหัวใจรุนแรง นี่
ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้:

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณี
ต่อไปนี้

คุณและแพทย์ประจำตัวต้องจดชื่อตราสินค้า
(ยี่ห้อ) และหมายเลขรุ่นการผลิตของยาของ
คุณไว้เสมอ

ปฏิกรรมการแพ้

- หากคุณมีปฏิกรรมการแพ้โดยมีอาการ
ต่าง ๆ เช่น แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
หรือ เวียนศีรษะ บวม หรือผื่น ห้ามฉีด
ยาอะบรีลาดาเพิ่ม และโปรดติดต่อแพทย์
ทันที เมื่อจากปฏิกรรมยาเหล่านี้สามารถ
เป็นอันตรายถึงชีวิตแม้จะเกิดขึ้นได้น้อยก็
ตาม

การติดเชื้อ

- หากคุณมีการติดเชื้อ ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อเรื้อรังหรือการติดเชื้อในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย (ด้วยย่างชื่น แพล เปื้อยที่ขา) โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มใช้อะบีลาดา ในกรณีที่ไม่แน่ใจ โปรดติดต่อแพทย์
- คุณอาจติดเชื้อได้ง่ายกว่าเดิมในระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยอะบีลาดา ความเสี่ยงนี้อาจเพิ่มขึ้นหากคุณมีปัญหาทางปอด การติดเชื้อเหล่านี้อาจร้ายแรง และรวมถึงวัณโรค การติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อรา ปรสิต หรือแบคทีเรีย หรือการติดเชื้อจวยโอกาสอื่น ๆ (จุลชีพที่ปกติไม่ก่อให้เกิดโรค) และภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (ภาวะโลหิตเป็นพิษ) การติดเชื้อเหล่านี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตแม้จะเกิดขึ้นได้น้อยก็ตาม ดังนั้นคุณจึงต้องแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีอาการต่าง ๆ เช่น มีไข้ บ้าดแพล รู้สึกเหนื่อย หรือปัญหาเกี่ยวกับฟัน นี่ถือเป็นเรื่องสำคัญ

อย่างยิ่ง แพทย์อาจแนะนำให้หยุดใช้อะบีลาดาชั่วคราว

วัณโรค

- เนื่องจากมีรายงานการเกิดวัณโรคในผู้ป่วยที่รักษาด้วยอะบีลาดีน แพทย์จะตรวจหาอาการแสดงและอาการของวัณโรคก่อนเริ่มใช้อะบีลาดา ซึ่งจะรวมถึงการประเมินทางการแพทย์อย่างละเอียด อันประกอบด้วยการซักประวัติการเจ็บป่วยในอดีต และการตรวจคัดกรองต่าง ๆ (ด้วยย่างชื่น การตรวจเอ็กซ์เรย์ ทรวงอกและการทดสอบวัณโรคทางผิวน้ำ) โปรดบันทึกการทดสอบและผลการตรวจเหล่านี้ไว้ในบัตรแจ้งเตือนสำหรับผู้ป่วย
- คุณต้องแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณเคยเป็นวัณโรคหรือเคยใกล้ชิดกับผู้ที่เคยเป็นวัณโรคงอก ก่อน นี่ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
- แม้ว่าคุณจะเคยได้รับการรักษาเพื่อป้องกันวัณโรคแล้วก็ตาม วัณโรคก็ยังเกิดขึ้นได้ในระหว่างการรักษาด้วยยาอีกด้วย

- หากอาการของวัณโรค (ด้วยย่างชื่น ไอ เรื้อรัง น้ำหนักลดลง ไม่มีเรี่ยวแรง มีไข้ ออก ฯ) หรือการติดเชื้อรูปแบบอื่นได้ปรากฏขึ้นระหว่างหรือหลังจากการรักษา โปรดแจ้งแพทย์ทันที

การเดินทาง / การติดเชื้อช้า

- โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณเคยอาศัยหรือเดินทางไปยังภูมิภาคที่มีโรคติดเชื้อรา เช่น histoplasmosis coccidioidomycosis หรือ blastomycosis เป็นโรคประจำถิ่น (พบการติดเชื้อตั้งกล่าวในพื้นที่นั้น)
- โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีการติดเชื้อชึ้นเกิดช้า ๆ หรืออาการอื่นใดที่เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ
- โปรดอยู่สั้นๆ เกตอาการแสดงของการติดเชื้อเป็นพิเศษในระหว่างที่รับการรักษาด้วยอะบีลาดา คุณต้องแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีอาการของการติดเชื้อ เช่น มีไข้ บ้าดแพล รู้สึกเหนื่อย หรือปัญหาเกี่ยวกับฟัน นี่ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

ไวรัสตับอักเสบบี

- โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี (hepatitis B virus [HBV]) หากคุณเกิดการติดเชื้อ HBV ที่แสดงอาการ หรือหากคุณคิดว่าคุณอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อ HBV แพทย์ควรสั่งตรวจหาไวรัสตับอักเสบบีให้คุณ คาดลิมูแม่นสามารถทำให้การติดเชื้อ HBV กำเริบได้ในผู้ที่เป็นพาหะของไวรัสนี้ ในผู้ป่วยบางราย การกำเริบของการติดเชื้อ HBV อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณใช้ยาชนิดอื่นซึ่งกระดับภูมิคุ้มกันร่วมด้วย แต่เกิดได้น้อย

ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

- หากคุณมีอายุ 65 ปีขึ้นไป คุณอาจໄວต่อการติดเชื้อมากขึ้นในขณะที่กำลังใช้อะบรีลาดา คุณและแพทย์ควรอยู่สังเกตอาการแสดงของการติดเชื้อเป็นพิเศษในระหว่างที่รับการรักษาด้วยอะบรีลาดา คุณต้องแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีอาการของการติดเชื้อ เช่น มีไข้ น้ำดрапel

รู้สึกเหนื่อย หรือปัญหาเกี่ยวกับฟัน นี่ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

การผ่าตัดหรือการทำหัตถการทางทันตกรรม

- หากคุณจะเข้ารับการผ่าตัดหรือทำหัตถการทางทันตกรรมใด ๆ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบว่าคุณกำลังใช้อะบรีลาดา แพทย์อาจแนะนำให้หยุดใช้อะบรีลาดาชั่วคราว

โรคปลอกประสาทอักเสบ

- หากคุณเป็นโรคปลอกประสาทอักเสบ (โรคที่มีผลต่อปลอกประสาทที่หุ้มรอบเส้นประสาท เช่น โรคมัลติเพลิสเคลโลโรชิส) อยู่ก่อนหรือเพิ่งเกิดเป็นโรคขึ้นมา แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าคุณควรได้รับหรือใช้อะบรีลาดาต่อหรือไม่ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในหันทีหากคุณมีอาการต่าง ๆ เช่น การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป แขนหรือขาอ่อนแรง รู้สึกชาหรือเป็นหนึบในส่วนใด ๆ ของร่างกาย

การรับวัคซีน

- รับวัคซีนบางชนิดมีส่วนประกอบของแบคทีเรียหรือไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคใน

รูปแบบเชื้อเป็น แต่เป็นเชื้อที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ และไม่ควรใช้ในระหว่างการรักษาด้วยอะบรีลาดา โปรดตรวจสอบกับแพทย์ของคุณก่อนรับวัคซีนใด ๆ และหากเป็นไปได้ ผู้ป่วยเด็กควรรับวัคซีนให้ครบตามกำหนดการฉีดวัคซีนของช่วงอายุนั้น ๆ ก่อนเริ่มการรักษาด้วยอะบรีลาดา หากคุณได้รับอะบรีลาดาในขณะที่ตั้งครรภ์ บุตรในครรภ์อาจมีโอกาสที่จะติดเชื้อสูงกว่าปกติเป็นระยะเวลานานถึงห้าเดือน โดยประมาณหลังจากที่คุณได้รับยาครั้งสุดท้ายในระหว่างตั้งครรภ์ คุณต้องแจ้งให้แพทย์ผู้ดูแลบุตรของคุณและบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ทราบว่าคุณได้ใช้อะบรีลาดาในระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าบุตรของคุณควรจะได้รับการฉีดวัคซีนใด ๆ นี่ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

หัวใจวาย

- คุณต้องแจ้งให้แพทย์ทราบว่าคุณเคยมีหรือมีอาการทางหัวใจรุนแรง นี่ถือเป็น

เรื่องสำคัญอย่างยิ่ง หากคุณมีอาการของภาวะหัวใจวายที่ไม่รุนแรง และกำลังได้รับการรักษาด้วยอะบรีลาดา แพทย์จะต้องตรวจติดตามสถานะโรคหัวใจวายของคุณอย่างใกล้ชิด หากคุณมีอาการของภาวะหัวใจวายที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือแยกจากเดิม (เช่น หายใจไม่ออกรหัส เอฟ บล็อก) คุณต้องติดต่อแพทย์ในทันที

มีไข้ รอยข้า เลือดออก หรือดูซีดเฉียบ

- ในผู้ป่วยบางราย ร่างกายอาจไม่สามารถผลิตเซลล์เม็ดเลือดที่มีหน้าที่ต่อสู้กับการติดเชื้อหรือห้ามเลือดได้มากเพียงพอ หากคุณมีไข้ติดต่อ กันเป็นเวลานาน หรือเกิดรอยข้า หรือเลือดออกได้ง่ายมาก หรือดูซีดเฉียบมาก โปรดโทรศัพท์หาแพทย์ของคุณในทันที แพทย์อาจตัดสินใจที่จะหยุดการรักษาของคุณ นั่นเอง
- มีการเกิดมะเร็งบางประเภทในเด็กและผู้ใหญ่ที่รับอะดาลิมูนีบล็อกหรือยากระจุ่มที่เอ็นเอฟอัลฟ่า บล็อกเกอร์ชนิดอื่นๆ แต่เกิดขึ้นได้น้อยมาก ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรุ

มาตรฐานอยู่ด้รุนแรง ซึ่งป่วยเป็นโรคดังกล่าวต้องน้ำเหลืองและมะเร็งเม็ดเลือดขาว (มะเร็งที่เซลล์เม็ดเลือดและไขกระดูก) สูงกว่าบุคคลทั่วไป การใช้อะบรีลาดาอาจทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต้องน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือมะเร็งชนิดอื่น ๆ สูงขึ้น พบการเกิดมะเร็งต้องน้ำเหลืองประเภทที่พบไม่บ่อยและรุนแรงในผู้ป่วยที่รับยาอะดาลิมูนีบล็อก แต่มีโอกาสสนับสนุน นอกจากนี้ ผู้ป่วยเหล่านั้นบางรายยังได้รับการรักษาด้วยยาอะชาไธโอพรินหรือเมอร์แคปโตพิวรินร่วมด้วย โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณได้รับยาอะชาไธโอพรินหรือเมอร์แคปโตพิวรินร่วมกับอะบรีลาดา

- นอกจากนี้ ยังมีรายงานการเกิดมะเร็งผิวนังชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งเม็ดสีในผู้ป่วยที่รับยาอะดาลิมูนีบล็อก หากพบความผิดปกติที่ผิวนังซึ่งเกิดขึ้นใหม่ในระหว่างหรือหลังการรักษา หรือหากดำเนินหรือความผิดปกตินผิวนังที่มีอยู่

เดินเปลี่ยนแปลงไป โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ

- มีรายงานการเกิดมะเร็งชนิดอื่นๆ นอกจำกัดมะเร็งต้องน้ำเหลืองในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดชนิดหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่า โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease [COPD]) ที่ได้รับการรักษาด้วยยาที่เอ็นเอฟ อัลฟ่า บล็อกเกอร์ตัวอื่น หากคุณมีภาวะ COPD หรือเป็นผู้ที่สูบบุหรี่จัด ควรปรึกษาแพทย์ว่าการรักษาด้วยยาที่เอ็นเอฟ อัลฟ่า บล็อกเกอร์เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่

โรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อของตนเอง

- การรักษาด้วยอะบรีลาดาอาจก่อให้เกิดกลุ่มอาการที่คล้ายกับโรคลูปัส แต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย โปรดติดต่อแพทย์หากเกิดอาการต่าง ๆ เช่น ผื่นเรื้อรังที่ไม่สามารถหาสาเหตุการเกิดได้ มีไข้ ปวดข้อ หรืออ่อนเพลีย

การใช้ยาอีนร่วมกับยาอะบรีลัดา

โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณกำลังใช้ เพิ่งใช้ หรืออาจจะใช้ยาอีนได้ ร่วมด้วย

สามารถใช้อะบรีลัดาาร่วมกับเมโนเทรกเซฟ หรือยาต้านรูมาติกที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคสำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ บางชนิดได้ (เช่น ขัลฟ้าชาลาซีน ไ媳ดรอก ซีคลอโรควิน เลฟลูโนไมด์ และยาฉีดที่มีส่วนประกอบของทอง) คอร์ติโคสเตอรอยด์ หรือยาแรงรับปวด รวมถึงยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตอรอยด์

คุณไม่ควรใช้อะบรีลัดาาร่วมกับยาที่มีอะนาคิโนราหรืออะนาทาเซ็นท์ เนื่องจากความเสี่ยงในการติดเชื้อร้ายแรงจะเพิ่มขึ้น ไม่แนะนำให้ใช้ยาอะดาลิมูแมบและยากลุ่มที่เอ็นเอฟ-แอนท่าโกโนสต์ตัวอื่น ๆ ร่วมกับอะนาคิโนราหรืออะนาทาเซ็นท์ เนื่องจากความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่อาจเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อร้ายแรง และการขัดฤทธิ์กันของยา (อันตรกิริยาระหว่างยา) ที่

อาจเกิดขึ้นได้ หากมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ

การใช้ยาในหญิงมีครรภ์และในระยะให้นมบุตร

คุณควรพิจารณาหารือคุณกำหนดที่เพียงพอเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และคุณกำหนดต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อยที่สุด 5 เดือนหลังจากที่ได้รับการรักษาด้วยอะบรีลัดา ครั้งสุดท้าย

หากคุณกำลังตั้งครรภ์ คิดว่าอาจตั้งครรภ์หรือกำลังวางแผนที่จะตั้งครรภ์ โปรดปรึกษาแพทย์เรื่องการใช้ยา

ควรใช้อะบรีลัดาในระหว่างการตั้งครรภ์ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

จากการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ ไม่พบว่าความเสี่ยงต่อความพิการแต่กำเนิดสูงขึ้นแต่อย่างใด เมื่อแม่ได้รับยาอะดาลิมูแมบในระหว่างตั้งครรภ์ เมื่อเทียบกับแม่ที่เป็นโรคเดียวกันซึ่งไม่ได้รับยาอะดาลิมูแมบ

สามารถใช้อะบรีลัดาในระยะให้นมบุตรได้ หากคุณได้รับอะบรีลัดาในระหว่างการตั้งครรภ์ บุตรของคุณอาจมีความเสี่ยงต่อ

การติดเชื้อมากขึ้น คุณจะต้องแจ้งให้แพทย์ผู้ดูแลบุตรของคุณและบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ทราบว่าคุณใช้อะบรีลัดาในระหว่างตั้งครรภ์ก่อนที่บุตรของคุณจะได้รับการฉีดวัคซีนใด ๆ นี่ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

การขับขี้ยานพาหนะและควบคุมเครื่องจักรกล

อะบรีลัดาอาจส่งผลเล็กน้อยต่อความสามารถในการขับขี่ บันจารยาน หรือใช้เครื่องจักร อาจรู้สึกว่าห้องโคลงเคลง (อาการบ้านหมุน) และการมองเห็นผิดเพี้ยนได้หลังจากใช้อะบรีลัดา

อะบรีลัดาไม่ใช้เดย์มเป็นส่วนประกอบยา น้ำมือชีเดย์มต่ำกว่า 1 มิลลิโนล (23 มิลลิกรัม) ต่อขนาดยา 0.8 มิลลิลิตร ซึ่งถือได้ว่า ‘ปราศจากโซเดย์ม’

3. ວິທີໃໝ່ຢາ

3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพาะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่เข้มข้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - ใช้ยาที่ได้ถูกต้องตามที่แพทย์หรือเภสัชกรสั่งเสมอ ส่วนความแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณไม่แน่ใจ 医師이나 약사가 확신하지 않으면 그에 대한 질문을 해야 한다. แพทย์อาจสั่งยาอะบารีล่าดาที่มีความแรงอื่นให้คุณหากคุณจำเป็นต้องใช้ยาในขนาดยาอื่น
 - การใช้ยาอะบารีล่าดาทำโดยฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ในโภคการฉีดใต้ผิวหนัง)

3.2 หากล้มเหลวตามรากฐานไร่

หากลืมจดยานี้ คุณควรจดยาอะบีร์ลาดาครั้ง
ถัดไปทันทีที่นักออก จากนั้นจึงจดยาครั้ง
ถัดไปตามกำหนดการเดิมที่จะต้องจดยา
หากคุณไม่ได้ลืมจดยา

3.3 ភាគីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួន

ทำอย่างไร

หากคุณแพลงดียาอะบริลาราดับบอยครั้งกว่า
ที่ควร โปรดโทรศัพท์ไปหาแพทย์หรือเภสัช

การและอธิบายว่าคุณได้จัดรายการมากกว่าที่
จำเป็น โปรดพอกล่องกระดาษบรรจุยาติดตัว
เสมอ แม้ว่าจะเป็นกล่องเปล่าก็ตาม และ
โปรดสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมี
อาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบแจ้งแพทย์
หรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
 - ห้ามหยุดใช้ยาเอง และให้ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
 - โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจหยุดใช้ยาจะบริลดา อาการของคุณอาจกลับคืนมาได้เมื่อหยุดการรักษา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหดยาแล้วรีบไปปน แพทย์ทันที

- ผืน ผืนลมพิษ หรืออาการแสดงของปฏิกิริยาการแพ้ได้ ๆ ที่มีอาการรุนแรง
 - ไข้หน้า มือ เท้าบวม

- หายใจติดขัด กลืนลำบาก
 - หายใจไม่ออกรสเมื่อใช้แรง หรือเมื่อนอนราบ หรือเท้าบวม

“หากมีอาการเหล่านี้ ให้นายดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- อาการแสดงและอาการของการติดเชื้อ เช่น มีไข้ รู้สึกอยากอาเจียน มีน้ำดрапแลบ ปัญหาเกี่ยวกับพื้น รู้สึกปวดแสนปวดร้อนขณะปัสสาวะ รู้สึกอ่อนแรง หรือเหนื่อย หรือไอ
 - อาการของปัญหาที่เกี่ยวกับเส้นประสาท เช่น รู้สึกเป็นเห็บ ชาเห็บภาพข้อน หรือแขวนขาอ่อนแรง
 - อาการแสดงของมะเร็งผิวหนัง เช่น มีก้อนใต้ผิวหนังหรือแผลที่ไม่ยอมหาย
 - อาการแสดงและอาการที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติของเลือด เช่น มีไข้ไม่หาย รอยดำ เลือดออก ผิวซีด “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการrunแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาเนื้อย่างไร

- เก็บระบบอภิจีดยาบรรจุเสร็จ/ปากกาฉีดยาบรรจุเสร็จไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา (กล่องชั้นนอก) ให้พ้นจากแสง
- เก็บไว้ในตู้เย็น (2 องศาเซลเซียส - 8 องศาเซลเซียส) ห้ามแช่แข็ง
- เก็บยานี้ให้พ้นจากสายตาและมือเด็ก
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายุที่ระบุไว้บนฉลาก/ แพนบลิสเตอร์/ กล่อง ซึ่งอยู่หลังคำว่า "EXP"

ทางเลือกอื่นในการเก็บรักษายา:

- หากจำเป็น (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องเดินทาง) อาจเก็บของบริลาราดาที่บรรจุในระบบอภิจีดยาบรรจุเสร็จ/ปากกาฉีดยาบรรจุเสร็จสำหรับใช้ครั้งเดียวไว้ที่อุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส) ได้นานสูงสุด 30 วัน – โปรดดูแลให้แน่ใจว่ายาไม่โดนแสง เมื่อนำยาออกมายากตู้แช่เย็นมาเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง จะต้องใช้ระบบอภิจีดยาอีกครั้ง

ภายใน 30 วันหรือทิ้งระบบอภิจีดยา แม้จะนำกลับไปเก็บไว้ในตู้แช่เย็นแล้วก็ตาม

- ควรจดบันทึกวันที่ซึ่งได้นำระบบอภิจีดยา/ปากกาฉีดยาออกมายากตู้แช่เย็นครั้งแรก และวันที่ต้องทิ้งระบบอภิจีดยา/ปากกาฉีดยานั้น
- ห้ามทิ้งยาใด ๆ ลงไปในท่อน้ำทิ้งหรือในถังขยะในบ้านเรือน โปรดสอนความแพทย์หรือเภสัชกรว่าจะทิ้งยาที่คุณไม่ใช้แล้วอย่างไร มาตรการเหล่านี้มีขึ้นเพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อม

- ส่วนประกอบอื่น ๆ: แอล hüสทิดีน/แอล hüสทิดีนไอกอคลอไร์ดโนโนไซเดรต ชูโครส เอเดเกตไดโซเดียมไดไซเดรต แอลมีไธโอนีน โพลีชอร์เบต 80 และน้ำสำหรับฉีด

ผู้นำเข้า: บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของอย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร**

PIL Revision no: 1

PIL date: April 10, 2020

Country: Thailand