

เอกสารกำกับยาภาษาไทย
แม็กเทน
MAGTEN

ส่วนประกอบ : ในสารละลายยา 10 mL.

ประกอบด้วย Magnesium Sulfate 10% w/v 81 15/12/46

ข้อบ่งใช้ : ใช้รักษาและป้องกันภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ และอาการชักของ โรคลมบ้าหมู
ใช้ป้องกันอาการชัก ในโรคพิษแห่งครรภ์ระยะชักและระยะก่อนชัก

ขนาดที่ใช้ :

ผู้ป่วยที่มีภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ

ทารกแรกเกิด : ใช้ 25 – 50 มก./น.น./ก.ก./ครั้ง ฉีด IV ทุก ๆ 8-12 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง

เด็ก : ใช้ 25 – 50 มก./น.น./ก.ก./ครั้ง ฉีด IM หรือ IV ทุก ๆ 4-6 ชั่วโมง 3-4 ครั้ง

ผู้ใหญ่ : ใช้ 1 กรัม ทุก ๆ 6 ชั่วโมง 4 ครั้ง ฉีด IM หรือ IV สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ
แมกนีเซียมในเลือดต่ำมากอาจใช้ถึง 8-12 กรัม MgSO₄/วัน โดยแบ่งให้
เป็นหลายครั้ง

ผู้ป่วยที่มีอาการชัก และความดันโลหิตสูง

เด็ก : 20 – 100 มก./น.น./ก.ก./ครั้ง ฉีด IM หรือ IV ทุก ๆ 4-6 ชั่วโมง

การป้องกันอาการชักในโรคพิษแห่งครรภ์ระยะชักและระยะก่อนชัก

ผู้ใหญ่ : ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 1-4 กรัม ทุก ๆ 4 ชั่วโมง

ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ เริ่มต้น 4 กรัม ตามด้วย 1 – 4 กรัม/ชั่วโมง โดยการ

หยุดเข้าเส้นเลือดดำ ปริมาณที่ใช้สูงสุดไม่เกิน 30 – 40 กรัม/วัน

อัตราการหยุดเข้าเส้นเลือดดำไม่เกิน 1-2 กรัม/ชั่วโมง

ข้อควรระวัง : ระวังในการใช้กับคนไข้ที่ไตทำหน้าที่บกพร่อง ระวังในการใช้กับผู้ที่ไข้ยา Digitalis
เมื่อให้ Magnesium Sulfate โดยวิธีฉีดเข้าผู้ป่วยควรตรวจติดตามค่าต่างๆ เหล่านี้เป็น
ระยะในผู้ป่วย ได้แก่ ความดันโลหิต คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ระดับแมกนีเซียมในซีรัม
อัตราการหายใจ deep tendon reflex และการทำงานของไต

อาการไม่พึงประสงค์ : ภาวะเม็กนีเซียมในเลือดสูง

ปฏิกิริยาระหว่างยา : เสริมฤทธิ์ของยา Neuromuscular Blockers, digitalis glycosides.

ผลิตโดย : บริษัท ยูเมต้า จำกัด
26/18-21 ถนนรามอินทรา
บางเขน กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โทร. (662)943-5588 แฟกซ์ (662)943-5038

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดจะเห็นผล
ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ๒๘ (๓)
หรือ ๒๘ (๒) และ (๓) แห่งกฎกระทรวง

รฟ 15/12/41