

ทาดาลาฟิล
ความแรง 5, 10, 20 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า TAFIL 5, TAFIL 10,
TAFIL 20
(ทาฟิล 5, ทาฟิล 10, ทาฟิล 20)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าทาดาลาฟิล (Tadalafil) เป็นยาในกลุ่มขยายหลอดเลือดด้วยการยับยั้งเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสชนิดที่ 5

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้ในผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว ร่วมกับการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
- เฉพาะทาฟิล 5 ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตในผู้ใหญ่เพศชาย รวมถึงในผู้ที่มีอาการอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวร่วมด้วย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มขยายหลอดเลือดด้วยการยับยั้งเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสชนิดที่ 5
- ⊗ เป็นโรคหัวใจ หรือใช้ยารักษาโรคหัวใจกลุ่มไนเตรตอยู่
- ⊗ มีอาการหลอดเลือดสมองภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
- ⊗ มีความดันเลือดต่ำหรือความดันเลือดสูงที่ควบคุมไม่ได้
- ⊗ เคยสูญเสียการมองเห็นจากการขาดเลือดไปเลี้ยงบริเวณขั้วประสาทตา
- ⊗ กำลังใช้ยาริโอะซิควัทรักษาภาวะความดันโลหิตสูง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว มะเร็งไขกระดูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคตับ โรคไต
 - มีอวัยวะเพศผิดปกติ
- ไม่ทนต่อน้ำตาลนม เพราะยานี้มีแล็กโทสเป็นส่วนประกอบ
- ยานี้ไม่ใช่ในผู้หญิงหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

- ยานี้ไม่ใช่รักษาภาวะเร่งต่อมลูกหมาก
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ถ้ากำลังใช้ยาต่อไปนี้
 - ยารักษาต่อมลูกหมากโต
 - ยาลดความดันเลือด
 - ยารักษาเชื้อรา เช่น คีโทโคนาโซล อีทราโคนาโซล
 - ยาต้านไวรัสเอชไอวี
 - ยาแก้ชัก ฟิโนมารบิทาล เฟนิโทอิน คาร์บามาเซพีน
 - ไรแฟมพิซิน อีริโทรไมซิน คลาริโทรไมซิน
 - ยารักษาอาการอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวอื่น ๆ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ กินยาก่อนมีเพศสัมพันธ์ 30 นาที
 - ⊗ ห้ามกินยาเกินวันละ 1 ครั้ง
 - ⊗ ไม่แนะนำให้ใช้เป็นประจำทุกวัน
- โรคต่อมลูกหมากโต กินยาวันละหนึ่งครั้ง ในเวลาเดิมทุกวัน กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมหากินยา ควรทำอย่างไร

- ผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต ถ้าลืมหากินยา ให้กินทันทีที่นึกได้โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ก่อนกินยานี้ เพราะอาจทำให้เวียนหัวหรือหน้ามืดได้
- ระวังการรับประทานไขมันอิ่มตัวหรือใช้เครื่องจักรเพราะยานี้ทำให้เวียนหัวหรือหน้ามืดได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง
 - ปวดเค้นหัวใจ
 - การมองเห็นผิดปกติหรือสูญเสียการมองเห็น
 - การได้ยินลดลงหรือสูญเสียการได้ยิน
 - อวัยวะเพศแข็งค้างนานมากกว่า 4 ชั่วโมง
- "ให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที"**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดหัว ร้อนวูบวาบ คัดจมูก ปวดท้อง ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดแขนขา อาหารไม่ย่อย
 - ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ เหงื่อออกมาก เหนื่อยเป็นลม
- "ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

• ลักษณะของยา

ทาบิล 5: เม็ดกลม นูน เคลือบฟิล์มสีเหลืองอ่อน เรียบ ทั้งสองด้าน

ทาบิล 10: เม็ดรูปยาว ปลายมน ด้านไม่เท่า นูน เล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีเหลืองอ่อน ด้านหนึ่งมีอักษร T10 อีกด้านหนึ่งเรียบ

ทาบิล 20: เม็ดรูปยาว ปลายมน ด้านไม่เท่า นูน เล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีเหลือง ด้านหนึ่งมีอักษร T20 อีกด้านหนึ่งเรียบ

• ดัวยาสำคัญ ทาดาลาฟิล

• ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ แล็กโทส โมโนไฮเดรต, แล็กโทส โมโนไฮเดรต (สเปรย์ทราย), ครอสคาร์ เมลโลสโซเดียม, โซเดียมลอร์ลิลซัลเฟต, ไฮดรอกซี โพรพิล เซลลูโลส, ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส พี เอช 102, คอลลอยดอลซิลิคอนไดออกไซด์, แมกนีเซียมสเตียเรต, ไฮโปรมेलโลส, ไตรอะซีติน, ทัลค์, ไทเทเนียม ไดออกไซด์, ไอรอนออกไซด์สี เหลือง, น้ำ

ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย : บริษัท มิลลิเมด จำกัด (สาขา), จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 20 สิงหาคม 2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ยานี้ไม่ใช่ยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
2. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจ ที่ใช้ยาขยายหลอดเลือดกลุ่ม ไนเตรต เพราะอาจถึงตายได้
3. ห้ามใช้ยานี้ในเด็กและสตรี ผู้ที่เป็นโรคตับ หรือโรคไต
4. ห้ามใช้ยาเกินวันละ 1 ครั้ง
5. ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศอื่นๆ
6. หากมีอาการผิดปกติ เช่น ความผิดปกติทางสายตา ปวด กระจก เจ็บหน้าอก ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ เหงื่อออกมาก เหนื่อยเป็นลม ให้รีบพบแพทย์ทันที