

**ไพโอกลิทาโซน 15 มิลลิกรัม กับ
เม็ตฟอร์มิน 850 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า LODIGLIT F.C. TABLETS
15mg/850mg
(โลดิกลิท เอฟ.ซี. แท็บเล็ต
15มก./850มก.)**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ไพโอกลิทาโซน (pioglitazone) กับ เม็ตฟอร์มิน (metformin) เป็นยาในกลุ่มลดน้ำตาลในเลือด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายและแพทย์ได้วินิจฉัยแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ เป็นโรคหัวใจ โรคตับ โรคไต
- ⊗ ผู้ที่ติดเหล้า
- ⊗ ผู้ป่วยเบาหวานที่น้ำตาลในเลือดสูงมาก
- ⊗ กำลังมีอาการปวดท้องอาเจียน หายใจหอบ ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้
- ⊗ เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
- ⊗ ปัสสาวะเป็นเลือด
- ⊗ กำลังขาดน้ำ ท้องเสียมาก อาเจียนรุนแรงหลายครั้ง
- ⊗ จะต้องไปฉีดวัคซีนหรือเข้าหัตถการ
- ⊗ หญิงให้นมลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- เป็นโรคหัวใจ
- มีอาการบวม น้ำ หรือหัวใจวาย
- ตามืด การมองเห็นลดลง
- ซีสต์รังไข่
- โรคตับ การทำงานของตับผิดปกติ
- กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง
- ผู้ป่วยมีอายุน้อยกว่า 18 ปี
- กำลังใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษา เช่น
 - ยาต้านเบาหวานตัวอื่น
 - ยาลดไขมันในเลือด บางชนิด
 - ยารักษาโรคเบาหวาน บางชนิด
 - ยารักษาแผลในกระเพาะ บางชนิด

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร** เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที

3.2 หากลืมกิน ยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้เวลาของมื้อถัดไปให้รอกินยาของมื้อถัดไปโดยไม่เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาล

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเองและให้กินยาอย่างต่อเนื่อง เพราะการหยุดยาอาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงการขับชี่ยานพาหนะหรือทำงานกับเครื่องจักร ถ้ากินยานี้แล้วมีอาการตาพร่า
- แจ้งแพทย์และ/หรือเภสัชกรว่ากำลังใช้ยานี้ หากต้องผ่าตัดใหญ่
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่กินยานี้
- หากน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือกระดูกหักในช่วงที่กินยานี้ให้แจ้งแพทย์และ/หรือเภสัชกร
- ถ้ามีอาการใจสั่น หิวมาก ให้อมลูกอมหรือกินน้ำหวาน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ร่างกายขาดน้ำ เนื่องจาก อาเจียน ท้องเสีย มีไข้
- กำลังมีอาการปวดท้องอาเจียน หายใจหอบ ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้
- ปัสสาวะเป็นเลือด
- การมองเห็นผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อืดอืด จุกแน่น มีอาการแสบร้อนกลางอก เบื่ออาหาร อาหารไม่ย่อย ท้องเสีย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยาเม็ดเคลือบฟิล์มรูปยาวนูน ปลายมน สีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร SCP อีกด้านหนึ่งมีตัวเลข 976
- **ตัวยาสำคัญ** ไพโอกลิทาโซน 15 มิลลิกรัม กับ เม็ดฟอร์มิน 850 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่** โพวิโดน, ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส, ครอสคาร์เมลโลสไซเคียม, คอลอยดอลซิลิกอนไดออกไซด์, แมกนีเซียมสเตียเรต, โอปราตราย ทุ ไวท์

• ผู้ผลิต

STANDARD CHEM. & PHARM. CO. LTD. 2nd Plant Taiwan.

ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่าย

บริษัท ยูเนี่ยนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ตุลาคม 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 62

1. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่มีหัวใจล้มเหลวในระดับที่รุนแรง (NYHA ในระดับ 3 และ 4) ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว หากใช้ยานี้แล้วมีอาการหายใจลำบาก เหนื่อยง่าย น้ำหนักเพิ่มอย่างรวดเร็ว หรือเกิดอาการบวมมากให้รีบปรึกษาแพทย์โดยทันที
2. การใช้ร่วมกับ NSAIDs Coxib หรืออินซูลินจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดภาวะบวมน้ำและหัวใจล้มเหลวมากขึ้น ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
3. ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
4. ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่กำลังเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
5. ให้ใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงในผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ การใช้ยา pioglitazone มากกว่า 1 ปี อาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเพิ่มขึ้น
6. หากมีอาการ หรืออาการแสดงปัสสาวะเป็นเลือด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปวดเวลาปัสสาวะ ปวดหลัง หรือปวดท้อง ให้ปรึกษาแพทย์
7. ต้องใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น หากมีอาการเวียนจะเป็นลมให้รีบปรึกษาแพทย์

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**