

เมธิลเพรดนิโซโลน ความแรง 1 กรัมและ 2 กรัม ชนิดผงละลายสำหรับฉีด

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าเมธิลเพรดนิโซโลน โซเดียม ซักซิเนท (Methylprednisolone Sodium Succinate) มีตัวยา 1000 และ 2000 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มสเตียรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการแพ้ หรือลดการอักเสบที่รุนแรง และใช้รักษาโรคบางชนิดที่เกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ ที่แพทย์เห็นสมควร
- การใช้ยานี้อาจจะทำให้เกิดอันตรายรุนแรงได้จึงต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาในกลุ่มสเตียรอยด์ชนิดอื่น
- ติดเชื้อราบริเวณกว้าง แต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเร็วๆ นี้
- กำลังเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือลำไส้ เพราะยานี้ทำให้แผลรุนแรงขึ้นและกระเพาะอาหารหรือลำไส้ทะลุได้
- กำลังเป็นวัณโรค หรือกำลังติดเชื้อไวรัส เช่น อีสุกอีใส งูสวัด หัด หรือเริ่มที่กระจกตา เพราะทำให้โรคติดเชื้อเหล่านี้รุนแรงขึ้น
- กำลังเป็นโรคกระดูกพรุน เพราะทำให้กระดูกพรุนมากขึ้น กระดูกแตกหักง่ายขึ้น
- เป็นโรคทางจิตขั้นรุนแรง เพราะทำให้อาการทางจิตรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- เด็ก อาจทำให้เด็กเติบโตช้ากว่าปกติ
 - ผู้สูงอายุ เพิ่มความเสี่ยงต่ออันตรายจากยา
 - โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเคยมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลังจากใช้ยาสเตียรอยด์
 - โรคความดันเลือดสูง
 - โรคต่อหิน โรคต่อกระຈก
 - โรคตับ
 - โรคติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ยังไม่ได้รับการรักษา
 - โรคไต
 - โรคไทรอยด์บางชนิด
 - โรคเบาหวาน
 - โรคลมชัก
 - โรคหัวใจ
- กำลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรก เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้หากมีเหตุผลทางการแพทย์
- กำลังให้นมบุตร เพราะยาถูกขับออกทางน้ำนม
 - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น
 - ยาคุมกำเนิด
 - ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
 - ยาขับปัสสาวะ
 - ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 - ยาต้านเบาหวาน
 - ยาต้านวัณโรค
 - ยาต้านไวรัสเอดส์
 - ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ยาต้านเชื้อรา วัคซีน
 - เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน โดยฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือหยดเข้าหลอดเลือดดำ

3.2 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ระมัดระวังการขับถ่ายยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
- ควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อเลือดออกในกระเพาะอาหาร
- หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการป่วย เช่น ผู้ที่มีไข้หวัด ไอ จาม
- หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนอีสุกอีใส หรือโรคหัด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
 - ติดเชื้อรุนแรง
 - หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ หัวใจหยุดเต้น
 - อาการท้องอืด ปวดท้อง คลื่นไส้
- “หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

- หลอดเลือดดำอักเสบบริเวณที่ฉีดยา
- ปวดท้อง มีอาการคลื่นเหียน อยากจะอาเจียน
“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ผงยาปราศจากเชื้อ สำหรับฉีด สีขาวถึงออกขาว
- ประกอบด้วยเมธิลเพรดนิโซโลน โซเดียม ซักซิเนท
ความแรง 1 กรัมและ 2 กรัม

ผู้ผลิต บริษัทเอบีแอล เมดิคอล จำกัด
111 หมู่ 9 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร