

เทรลาไกลลิปติน
100 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ZAFATEK [ซาฟาเทค]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า เทรลาไกลลิปติน (trelagliptin) เป็นยาในกลุ่มลดระดับน้ำตาลในเลือด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในยานี้
- ห้ามใช้เมื่อเป็นโรคไตบกพร่องระดับรุนแรง
- ห้ามใช้เมื่อเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องล้างไต
- ห้ามใช้เมื่อเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1
- ห้ามใช้เมื่อเป็นผู้ป่วยที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากขั้นรุนแรง (ภาวะคีโตนแอซิดโตนอส) ซึ่งสังเกตได้จากอาการคลื่นไส้ อาเจียนมาก ปวดท้อง บัสสาวะมาก คอแห้ง กระหายน้ำมาก หายใจหอบลึก ลมหายใจมีกลิ่นหวาน
- ห้ามใช้เมื่อเป็นผู้ป่วยภาวะติดเชือรุนแรง
- ห้ามใช้เมื่อเป็นผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ผู้มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
- ผู้มีอายุมากกว่า 65 ปี
- หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่สงสัยหรือมีแนวโน้มจะตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร
- ผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง

“ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากการใช้ยา”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ยานี้กินสัปดาห์ละครั้ง ในวันเดียวกันของทุกสัปดาห์
- ให้กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามแบ่ง เคี้ยว หรือบดเม็ดยา
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- โดยทั่วไปให้กินยาทันทีที่นึกได้ มีต่อไปให้กินตามวันเดิมของสัปดาห์ ตามที่แพทย์สั่ง
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อลืมกินยานี้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ถ้ามีอาการผิดปกติรุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที และให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนกินยาเม็ดถัดไป

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้
- ห้ามกินยานี้ในขนาดสูงกว่าที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- ควบคุมอาหารและออกกำลังกายระหว่างการใช้นี้
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอันตรายที่อาจเกิดจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“หากมีอาการเหล่านี้ ต้องรีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ สังเกตจากอาการต่อไปนี้

วิ่งเวียน มึนงง หน้ามืด ตาลาย ใจสั่น เหงื่อออก หัว
ให้รีบดื่มน้ำหวาน หรืออมลูกอม ถ้าอาการยังไม่ดี
ขึ้น

ให้พบแพทย์ทันที

- ปวดหัว
- ปวดข้อ


“ให้รอดูอาการ แต่ถ้าทนไม่ไหวหรือมีอาการรุนแรงให้แจ้ง
แพทย์”

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควร
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาใน
ที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาออกจากแผง เมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
ห้ามแกะยาออกจากแผงและทิ้งไว้ เพราะยาอาจเสีย
ได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา

ยาเม็ดรูปยาวรี ปลายมน เคลือบฟิล์มสีชมพูอ่อน มีขีดแบ่ง
ครึ่งทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีตัวอักษร “ D” และ “389”
อยู่คนละด้านของขีดแบ่งครึ่ง

ส่วนประกอบของยานี้

แมนนิทอล ไมโครคริสตอลีน เซลลูโลส คลอสคาเมลโลส
โซเดียม ไฮดรอกซีโปรพิลเซลลูโลส โซเดียมสเตียริลฟู
มาเรท เพียวริไฟเวอเตอร์ ไฮโปรมेलโลส แมคโครกอล

6000 ไทเทเนียมไดออกไซด์ เรดเฟอริกไดออกไซด์ บิวทิล
แอลกอฮอล์

ผลิตโดย: ทาเคดา ฟาร์มาซูติคัล คอมพานี ลิมิเต็ด,
ประเทศ ญี่ปุ่น

นำเข้าโดย: บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด,
กรุงเทพมหานคร

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด, กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 15 มีนาคม 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

Version 1.1