

เฟอริกซิเทรต

ความแรง 500 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า **NEPHOXIL® Capsule 500 mg** (เนโฟซิล แคปซูล 500 มิลลิกรัม)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เฟอริกซิเทรต (ferric citrate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อควบคุมระดับฟอสฟอรัสในเลือดในผู้ใหญ่ที่ต้องเข้ารับการล้างไต

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นของยานี้ หรือธาตุเหล็ก หรือเกลือของเหล็กชนิดอื่น
- ⊗ มีภาวะธาตุเหล็กในเลือดมากกว่าปกติ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ผู้ที่มีภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือกำลังมีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
 - แฉงแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หากท่านใช้ยาอื่น เช่น ยาซีโปรฟลอกซาซิน และยาด็อกซิไซคลิน เป็นต้น หรืออาหารเสริมหรือสมุนไพร เพราะอาจส่งผลต่อการรักษาของยา
 - หญิงตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะท้อง
 - หญิงให้นมลูก

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยา ให้รอกินยาในมื้อถัดไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็นสองเท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประเมินอาการ และความเสี่ยง

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ควรตรวจระดับฟอสฟอรัสในเลือดเป็นประจำขณะใช้ยานี้ เพื่อป้องกันภาวะฟอสฟอรัสในเลือดต่ำ
- ขณะใช้ยานี้ อาจได้รับการติดตามค่าผลเลือดเป็นประจำเพื่อใช้ในการปรับขนาดยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผื่นปกติ
- มีอาการบวมหรือปวดเกร็งที่ช่องท้อง
- มีเลือดออกในอุจจาระ อาเจียนเป็นเลือด

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องเสีย ท้องผูก ปวดตึงหรือแน่นท้อง ปวดท้องไม่สบายท้อง
- คลื่นไส้ อาเจียน
- อุจจาระนิ่มลง อุจจาระมีสีดำหรือคล้ายขี้
- คันตามผิวหนัง
- ไอ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา: แคปซูลสีแดงเข้ม ตัวแคปซูลมีตัวอักษรและตัวเลข "NE26"
- **ตัวยาสำคัญ:** เฟอริกซิเทรต ความแรง 500 มิลลิกรัม (เทียบเท่าเหล็กเฟอริก 105 มิลลิกรัม)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่** เปลือกแคปซูล ประกอบด้วย เจลาติน (gelatin) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium Dioxide) ทาร์ทราซีน (tartrazine) โซเดียมลอริลซัลเฟต (sodium lauryl sulfate) บิลเลียนบลูเอฟซีเอฟ (brilliant blue FCF) อัลลูราเรดเอซี (allura red AC) และน้ำบริสุทธิ์ (purified water)

ผู้ผลิต: บริษัท แพนเนียน แอนด์ บีโอเพ็ ไบโอเทค จำกัด ประเทศไทย

ผู้นำเข้า: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: มิถุนายน 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

• <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

• <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร