

Darbepoetin alfa
ความแรง 30, 40 และ 120 ไมโครกรัม
ต่อ 0.5 มิลลิลิตร
ชนิด สารละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า Alvonesp (อัลโวเนสป์)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่าดาเบโพอิติน อัลฟา (Darbepoetin alfa) เป็นยาในกลุ่มการต้านภาวะโลหิตจาง
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้รักษาภาวะโลหิตจาง (เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย และหายใจขัด) ที่เกิดจากไตวายเรื้อรังในผู้ใหญ่และเด็ก และผู้ป่วยมะเร็งในผู้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัดที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ (หรือยาอื่นในกลุ่มอีริโทรโพอิติน)
 - ⊗ โรคความดันเลือดสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยาที่แพทย์สั่ง
 - ⊗ แพ้ยาฉีดที่มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรือตัวทำลาย
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นโรคความดันเลือดสูง และกำลังได้รับยารักษาความดันเลือดอยู่
 - เป็นโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (sickle cell anaemia)
 - เป็นโรคลมชัก
 - เป็นโรคตับ
 - เคยไม่ตอบสนองต่อยารักษาโรคโลหิตจางอย่างมีนัยสำคัญ
 - เป็นโรคตับอักเสบ
 - กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 - หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 - หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

- หากกำลังให้นมบุตร ควรหยุดการใช้ยานี้เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาไซโคลสพอริน และเทโครลิมีส เนื่องจากยานี้ส่งผลต่อปริมาณเม็ดเลือดแดง

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - อ่านคู่มือการใช้เข็มฉีดยาให้ละเอียดก่อนฉีดยานี้ หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลก่อนใช้ยา
 - ตรวจสอบอนุภาคปนเปื้อนก่อนใช้ยา เฉพาะสารละลายใสเท่านั้นที่ฉีดได้
 - ห้ามเขย่า
- 3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร**
- ห้ามฉีดยาซ้ำหากลืมฉีดยา
 - ให้รีบแจ้งแพทย์ทันที
- 3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ความดันเลือดสูง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณกำลังใช้ยา วิตามิน สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากคาดว่าจะตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะมีบุตร
- หากต้องการหยุดยาให้ปรึกษาแพทย์ก่อน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก

- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- เหนื่อยล้าผิดปกติ ไม่มีแรง

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว ง่วงนอน สับสน มองเห็นไม่ชัด คลื่นไส้ อาเจียน ชัก
- บวมหน้า

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 2°C - 8°C องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยานี้ไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** สารละลายใส ไม่มีสี สำหรับฉีด ในกระบอกฉีดยาที่บรรจุยาพร้อมฉีดยา
- **ตัวยาสำคัญ** ดาเบโพอิติน อัลฟา (Darbepoetin alfa)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ Sodium dihydrogen phosphate monohydrate (โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตโมโนไฮเดรต) Disodium phosphate dihydrate (ไดโซเดียมฟอสเฟตไดไฮเดรต) Sodium chloride (โซเดียมคลอไรด์) Polysorbate 80 (โพลีซอร์เบต 80) และ Water for injection (น้ำสำหรับฉีด)

ผู้ผลิต Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. ประเทศเกาหลีใต้

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ DDMMYY

- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**
- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
 - <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร