

ดีเฟอราซิร็อกซ์ 250 มิลลิกรัม
ยาเม็ดละลายน้ำ
ชื่อการค้า Deferasirox Teva (250 mg)
ดีเฟอราซิร็อกซ์ เทวา (250 mg)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าดีเฟอราซิร็อกซ์ (Deferasirox) มีตัวยาคดีเฟอราซิร็อกซ์ 250 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาขับเหล็ก

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาภาวะเหล็กเกินเรื้อรังเนื่องจากการรับเลือดในผู้ป่วยที่อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ร่วมกับยาขับเหล็กชนิดอื่น
- การทำงานของไตผิดปกติ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากมีภาวะต่อไปนี้
 - โรคตับ
 - โรคไต
 - โรคหัวใจจากภาวะเหล็กเกิน
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาลดกรด ยาลดไขมันซิมวาสแททิน
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้หญิงท้องเพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- ไม่ควรใช้ยานี้ในหญิงให้นมบุตร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- วิธีกิน: ละลายเม็ดยาในน้ำสะอาด หรือน้ำส้ม หรือน้ำแอปเปิ้ล 1 หรือ ครึ่งแก้ว คนให้ละลาย ดื่มให้หมดแก้วก่อนอาหารอย่างน้อย 30 นาที หรือตอนท้องว่าง และควรกินยาในเวลาเดียวกันทุกวัน

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ห้ามกินยาสองครั้งในหนึ่งวัน และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง ปวดศีรษะรุนแรง ท้องร่วงรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเพราะยาอาจทำให้เวียนหัว

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระมีสีดำ
- บัสสาวะลดลง
- การมองเห็นและการได้ยินผิดปกติ

- มีอาการวงเวียนศีรษะ ร่วมกับปวดท้องด้านขวาบน ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะมีสีเข้มขึ้น
“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว แขนขาบวม

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา แะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว และเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ดีเฟอราซิร็อกซ์ เทวา (250 mg) : ยาเม็ดกลมแบน สีขาว ถึงขาวนวล ขอบเอียง มีเลข 77 บนเม็ดยาด้านหนึ่ง และเลข 439 บนอีกด้านของเม็ดยา
ส่วนประกอบในตำรับ: แลคโตส โมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส, ครอสโพรโอดอน ชนิดเอ, โพรโอดอน เค 30, โซเดียม ลอริล ซัลเฟต, คอลลอยดอล ซิลิคอน ไดออกไซด์, แมกนีเซียม สเตียเรท
ผู้ผลิต: PLIVA Croatia Ltd, Zagreb, Croatia
ผู้นำเข้า: บริษัท สิลมการแพทย์ จำกัด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2562

Package
Leaflet - Thai

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร