

พาราเซตามอล ขนาด 325 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล Protemp (โปรเทมป์)

- คำเตือน**
- ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
 - หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบเพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
 - ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
 - หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนัง หลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าพาราเซตามอล(paracetamol) เป็นยาในกลุ่มลดไข้ บรรเทาปวด
- ยานี้ใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดจากข้อเสื่อม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาพาราเซตามอล หรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
 - ห้ามใช้พาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากและเอกสารกำกับยา เพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวาย และเสียชีวิตได้
 - หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากมีภาวะพร่องจีซิกซ์พีดี (G6PD) หรือกำลังกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดวอร์ฟาริน เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ง่ายขึ้น
- ถ้ามีไข้สูง(อุณหภูมิสูงกว่า 39.5 องศาเซลเซียส) ให้รีบไปพบแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
ตั้งแต่ 22 ถึง 44	กินยาครั้งละ 1 แคปซูล แต่ละครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 44	กินยาครั้งละ 2 แคปซูล แต่ละ ครั้งห่างกัน อย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

- 3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- รีบไปพบแพทย์ เพราะหากได้รับยาเกินขนาดไปมาก และได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที จะทำให้ตับถูกทำลาย นำไปสู่การเสียชีวิตจากตับวายได้

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่กินยาดูติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดภายใน 3 วัน หรืออาการปวดของเด็กไม่บรรเทาภายใน 5 วัน หรืออาการปวดของผู้ใหญ่ไม่บรรเทาใน 10 วัน ให้ไปพบแพทย์ เนื่องจากอาจเป็นอาการของโรคที่ร้ายแรงได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น**
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หากใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนัง หลุดลอก
 - มีจ้ำตามผิวหนัง เลือดออกผิดปกติ เหนื่อยง่าย เป็นหวัดได้ง่าย

ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- 5.2 หากจำเป็นต้องกินยานี้ต่อเนื่อง แล้วเกิดอาการ เช่น**

- อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้มขึ้น
- ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา:** แคปซูลนิม รูปร่างปลายมน สีแดง ภายในบรรจุของเหลวใสไม่มีสี
 - ตัวยาสาคัญ:** พาราเซตามอล
 - ส่วนประกอบอื่นๆ:** โพลีเอทิลีน ไกลคอล 400, โพรพิลีน ไกลคอล, โปวีโดน เค17 และ น้ำ
- ผู้ผลิต:** ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม 922 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ (66)-02-3311958, (66)-02-3311962
โทรสาร (66)-02-3115628
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2564**
ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.
- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
 - <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**