

**มอนเทลูคาสท์**  
**ความแรง 5 และ 10 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม**  
**ชื่อการค้า MONKAST (มอนคาสท์)**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่ามอนเทลูคาสท์ (montelukast)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อป้องกันและรักษาโรคหอบหืด
- บรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - ท้องหรือวางแผนที่จะท้อง
  - อยู่ในระยะให้นมลูก
  - ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
  - มีภาวะหอบหืดเฉียบพลัน

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ **ควรกินยาตอนเย็น**

### 3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้ รื้ออกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่ รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการ เดียวกัน
- อาการโรคหืดแยงให้พบแพทย์ทันที
- ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร ห้ามหยุดยาเอง ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการของโรค
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม ผลการรักษา และผลข้างเคียงจากยา
- ควรพกยาอื่นที่ใช้แก้จ็บหืดเฉียบพลันติดตัวไว้ตลอดเวลา เพราะยานี้ไม่ใช่ยาบรรเทาอาการหอบหืดเฉียบพลัน
- ยานี้ไม่มีผลต่อความสามารถในการขับขี่ยานยนต์หรือ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- อาการเปลี่ยนแปลง วิตกกังวล ซึมเศร้า มีความคิด อยากฆ่าตัวตาย

**“ให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที”**

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดหัว เวียนหัว
- เหนื่อย เพลีย ปวดข้อ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
- คลื่นไส้ ไม่สบายท้อง ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย
- ใจสั่น

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
 หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

### • ลักษณะของยา

- ความแรง 5 มิลลิกรัม เป็นยารูปเม็ดกลม นูน เคลือบ ฟิล์มสีส้ม เรียบทั้งสองด้าน

- ความแรง 10 มิลลิกรัม เป็นยารูปเม็ดกลม นูน เคลือบ ฟิล์มสีส้มอ่อน ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านหนึ่งมีตัวเลข 10

### • ตัวอย่างสำคัญ มอนเทลูคาสท์

ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม (Croscarmellose sodium), แล็คโตสโมโนไฮเดรต (Lactose monohydrate), ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส พีเอช 101 (Microcrystalline cellulose PH101), ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส (Hydroxy propyl cellulose), ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol), ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลสพีเอช 102 (Microcrystalline cellulose PH102), แมกนีเซียมสเตียเรต (Magnesium stearate), โอพาดรายเอเอ็มบีทูไวท์ (Opadry® AMB II white), เพียวริฟายวอเตอร์ (Purify water), เรดไอรอนออกไซด์ (Red iron oxide), เยลโลไวโรนออกไซด์ (Yellow iron oxide)  
 ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย: บริษัท มิลลิเมด จำกัด (สาขา), จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย  
 Call center 0 2945 9555

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ **09 กุมภาพันธ์ 2565**

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>