

**การต่อออกซิโคลิก
10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ชนิดยาฉีด**

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า การต่อออกซิโคลิก (deoxycholic acid) เป็นยากระเพาะปัสสาวะที่มีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะ

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อกำจัดไขมันในลำไส้และไขมันสะสมในมัณฑะสุมได้ดี



2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้เมื่อยาเสีย หรือส่วนประกอบของยาเสีย
- ห้ามใช้เมื่อมีการติดเชื้อริเวโนคามหรือโคชีนเป็นดำเนแหงที่จะฉีดยา

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา นักห่านมีภาวะต่อไปนี้

- หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
- มีภาวะเลือดออกผิดปกติ หรือผู้ระหว่างกินยาต้านเกร็ลล์เลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด
- เคยดูดไขมัน ผ้าตัด หรือมีแพลเป็นรอบคางและคอ
- มีภาวะกลืนลำบาก
- ต้องไม่ครอบตัว หรือต้องน้ำเหลืองโดย

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เกลลัชกร เท่าที่แนะนำและระยะเวลาในการใช้ยาที่เข้มข้นกับความรุนแรงของโรค

- ยานี้ควรฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
- ฉีดได้ไม่เกิน 6 ครั้ง แต่ละครั้งต้องฉีดห่างกัน 1 เดือน

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

3.3 ถ้าเกิดยาห้ามใช้แล้ว ควร怎么办

- ในสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ รับน้ำส่องตรวจทางห้องทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากกำลังใช้ยาต้านเกร็ลล์เลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด วิตามิน สมุนไพรหรืออาหารเสริมอยู่ ควรแจ้งแพทย์ เกลลัชกร หรือพยาบาลทุกครั้ง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที
ได้แก่

- ในหน้า เปสือกด ริบฟีปากวนหรือมีผื่นลมพิษ
- ผิวนังตามตัวมีจ้ำเลือด ผื่นแดง ตุ่มพอง หรือหลุดลอก
- แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก หน้ามืด เป็นลม
- อาการที่แสดงว่าเส้นประสาทที่คงหรือคออักเสบ ได้แก่ ยื้นแล้วปากหรือลิ้นเนื้อในหน้าเบี้ยว

* หากเกิดอาการเหล่านี้
ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที *

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงในไปพบแพทย์ทันที ได้แก่

- บริเวณที่ฉีด ปวด แดง คัน ฝอกช้ำหรือผิวน้ำยื้น
- กลืนอาหารลำบากและปวดเวลาลากสิน

* อาการเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ เนื่องจากจะหายได้เองโดยไม่ต้องรักษา *

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง
- ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

ผู้ผลิต :

Hospira, Inc. McPherson, KS, USA

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย :

บริษัท แอลลิเออร์แคน (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยในปรึกษาแพทย์หรือเกลลัชกร

เอกสารอ้างอิง: EU Patient Information Leaflet (EU PIL)