

**ไบโซโพรลอล ฟูมาเรต
ความแรง 5 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า CARDISOL (คาร์ดิซอล)**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า ไบโซโพรลอล ฟูมาเรต (bisoprolol fumarate) เป็นยาในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง และอาการเจ็บหน้าอกเรื้อรัง
- ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการคงตัว

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ เป็นโรคหอบที่รุนแรง หรือเป็นโรคปอดเรื้อรัง
- ⊗ มีภาวะหัวใจเต้นช้า หรือผิดจังหวะ (น้อยกว่า 60 ครั้ง/นาที)
- ⊗ มีความดันโลหิตต่ำมาก
- ⊗ มีอาการภาวะเลือดไหลเวียนผิดปกติรุนแรง เช่น นิ้วมือนิ้วเท้าสั่น ชีต หรือมีสีม่วง
- ⊗ มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่ยังไม่ได้รับการรักษา
- ⊗ มีภาวะช็อคจากโรคหัวใจ
- ⊗ มีภาวะเลือดเป็นกรด
- ⊗ เป็นเนื้องอกที่ต่อมหมวกไต

1.3 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้**
 - หงุดหงิดท้อง และให้หมกควรระวังการใช้ยานี้
 - หากเป็นหืด หรือเป็นโรคปอดเรื้อรัง
 - หากเป็นโรคเบาหวาน
 - หากเป็นโรคหัวใจ
 - หากดับหรือได้มีปัญหา
 - หากมีปัญหากับการไหลเวียนเลือดบริเวณแขน ขา
 - หากเป็นหรือเคยเป็นสะเก็ดเงิน
 - หากเป็นไทรอยด์ เนื่องจากยานี้จะบดบังอาการ
- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาเมโพลควิน ยาไรแฟมพิซิน ยากลุ่มเออร์โกตามีน**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร** เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้านึกขึ้นได้เมื่อข้ามวันมาแล้ว ให้รอกินยาของมื้อต่อไปในขนาดปกติ ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น เวียนหัว ปวดหัว อ่อนเพลีย หอบ หายใจมีเสียงหวีด เป็นต้น **ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที**

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- **ไม่**นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และกินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- หัวใจเต้นช้า หัวใจเต้นผิดจังหวะ อาการของภาวะหัวใจล้มเหลวแย่งแย่ง
- มึนหัว หมดสติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- เวียนหัว ปวดหัว
- รู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย การนอนหลับผิดปกติ
- สมรรถภาพทางเพศลดลง

- กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นตะคริว มือและเท้าเย็น
- ความดันต่ำ
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก
- ตาแห้ง ตาแดง ระคายเคืองตา
- ผม่ว
- **“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะของยา** เป็นยาเม็ดกลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีเหลืองอ่อน ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ
- **ตัวยาคือ** ไบโซโพรลอล ฟูมาเรต
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ ครอสโพรโพลอน, แป้งข้าวโพด, ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส พีเอช 102, แอนไฮดรึสแคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต, คอลลอยด์ซิลิคอนไดออกไซด์, แมกนีเซียมสเตียเรต, โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, ไทเทเนียมไดออกไซด์, ทัลคัม, โพลีเอทิลีนไกลคอล, เลซิดิน, เยลโลโอออนไดออกไซด์, น้ำ

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย :

บริษัท มิลลิเมด จำกัด (สาขา)
174 หมู่ที่ 8 ตำบลบางาม อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย 57210 ประเทศไทย
Call center 0 2945 9555

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มกราคม 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

