

ฟูลเวสแทรนท์
ความแรง 250 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิกรัม
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า Fulvafit (ฟูลวาฟิท)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า ฟูลเวสแทรนท์ (Fulvestrant) มีตัวยา 250 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มต้านฮอร์โมนเอสโตรเจน
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้รักษามะเร็งเต้านมระยะลุกลาม หรือ ระยะแพร่กระจาย ในผู้หญิงหลังหมดประจำเดือน ที่แพทย์เห็นว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่**
- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
 - ⊗ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์
 - ⊗ เมื่ออยู่ในระยะให้นมลูก เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อเด็ก
 - ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่มีการตั้งครรภ์อย่างรุนแรง
 - ⊗ ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีภาวะตับหรือไตทำงานบกพร่อง
 - ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
 - ผู้ป่วยมีอาการเลือดออกผิดปกติ
 - ผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ
 - ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - บุคลากรทางการแพทย์จะเป็นผู้เตรียมยาและให้ยากับท่าน
- 3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร**
- ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร
- 3.3 หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที**

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- **พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ** เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลว่ากำลังใช้ยานี้
- ระหว่างใช้ยานี้ ผู้หญิงต้องคุมกำเนิดและหยุดให้นมลูก
- หลังจากใช้ยานี้ครั้งสุดท้าย ให้คุมกำเนิดต่อไปอีก 2 ปี
- ระมัดระวังการขับชียานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- “หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาลหรือ เภสัชกรทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- คลื่นไส้ ปวดท้อง
- ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด มีผื่นบริเวณที่ฉีด
- อ่อนเพลีย ปวดหลัง ปวดข้อและกล้ามเนื้อ
- ร้อนวูบวาบ ประจำเดือนไม่ปกติ มีระดูมาก หรือ กะปริดกะปรอย

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** สารละลายใส ไม่มีสีถึงสีเหลือง มีความหนืด ปราศจากอนุภาคที่มองเห็นได้
- **ตัวยาสําคัญ** ฟูลเวสแทรนท์ (Fulvestrant)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ เอทานอล, เบนซิลเบนโซเอตและเบนซิลแอลกอฮอล์

ผู้ผลิต: Eugia Pharma Specialities Limited, India.
ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท เอพีแอล ฟาร์มา ไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 24 เมษายน 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร