

Sequence Package Leaflet - Thai

# Dorzolamide ความแรง 20 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร

## ชนิดยาหยอดตา

### ข้อควรคำ Dorzolamide Symgens (ดอร์โซลาไมด์ ซิมเจนส์)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าดอร์โซลาไมด์ ไฮโดรคลอไรด์ (Dorzolamide Hydrochloride) มีตัวยา ดอร์โซลาไมด์ ไฮโดรคลอไรด์ (Dorzolamide Hydrochloride 20 มิลลิกรัม) เป็นยาในกลุ่มรักษาโรคต้อหิน

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้สำหรับรักษาความดันลูกตาที่สูงขึ้นในผู้ป่วยต้อปื้น, ความดันลูกตาสูง, โรคต้อหินชนิดมุมม่านตาเปิด, โรคต้อหินชนิดที่มีขุ่นในตาและโรคต้อหินชนิดมุมม่านตาเปิดแบบทุติยภูมิ, ใช้ในการรักษาระยะสั้นโดยให้ร่วมกับยาปิดกั้นตัวรับเบต้า หรือใช้เดี่ยวๆในการรักษาโรคต้อหินในผู้ป่วยเด็ก

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีความผิดปกติของไตอย่างรุนแรงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของไตหรือมีประวัติการเกิดนิ่วในไต
- ขณะใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา carbonic anhydrase inhibitor เช่น acetazolamide

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - หากมีภาวะที่เกี่ยวข้องกับตา หรือเคยผ่าตัดตา
  - หากมีอาการระคายเคืองตาหรือปัญหาเกี่ยวกับตา เช่น ตาแดงหรือเปลือกตาบวม
  - หากสงสัยว่ายานี้ก่อให้เกิดอาการแพ้ (เช่น ผื่นที่ผิวหนังอย่างรุนแรงหรือมีอาการคัน) ให้หยุดใช้และติดต่อแพทย์
  - หากมีภาวะที่เกี่ยวข้องกับโรคตับ

• ตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยานี้

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้นี้นั้นขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- หากแพทย์ให้ใช้เพียงชนิดเดียวปริมาณที่แนะนำคือหยดตาข้างที่เป็น 1 หยด ในตอนเช้า บ่ายและเย็น
- วิธีใช้ยา  
แนะนำให้ผู้ป่วยเขย่าวขดก่อนใช้ ควรระมัดระวังไม่ให้ปลายหลอดหยดของขวดยาสัมผัสเปลือกตา บริเวณรอบๆหรือพื้นผิวบริเวณอื่นๆ และแนะนำให้ผู้ป่วยปิดขวดยาให้สนิทเมื่อไม่ได้ใช้

### 3.2 หากลืมหยอดตาควรทำอย่างไร

- ให้หยอดโดยเร็วที่สุดทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าหากใกล้เวลาสำหรับการหยอดตาครั้งถัดไปให้ข้ามปริมาณที่ไม่ได้รับและกลับไปหยอดตามตารางการให้ยาตามปกติ
- อย่าเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าเพื่อชดเชยขนาดยาที่ลืม

### 3.3 ถ้าหยอดตายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากต้องการหยุดใช้ยานี้ควรปรึกษาแพทย์
- หลังจากใช้ยาอาจจะมองเห็นไม่ชัดหรือไม่คงที่ชั่วคราว อย่าขับรถ ใช้เครื่องจักร หรือทำกิจกรรมที่ต้องการการมองเห็นที่ชัดเจน จนกว่าจะสามารถทำกิจกรรมนั้นได้อย่างปลอดภัย

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- แสบตาหรือแสบร้อนบริเวณตา เจ็บตา ตาพร่ามัว คันตา ระคายเคือง หรือ การอักเสบของเปลือกตา
- คลื่นไส้ หรือ ได้รับรสขม
- อ่อนเพลีย ปวดหัว

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- หลังจากเปิดใช้งานควรใช้ภายใน 28 วัน และเก็บที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา สารละลายใส ไม่มีสี มีความหนืดเล็กน้อย บรรจุอยู่ในขวด MDPE ขนาด 5 มิลลิลิตร
- ตัวยาสาคัญ ดอร์โซลาไมด์ ไฮโดรคลอไรด์ (Dorzolamide Hydrochloride)
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ Mannitol (แมนนิทอล) Sodium citrate (โซเดียมซิเตรต) Hydroxy Ethyl Cellulose (ไฮดรอกซี เอทิล เซลลูโลส) Sodium Hydroxide (โซเดียมไฮดรอกไซด์) Benzalkonium Chloride solution (เบนซาลโคนเนียมคลอไรด์) Water for injection (น้ำสำหรับฉีด)

ผู้ผลิต บริษัท ฟาร์มา เอ.วี.อี อะลิโมส จำกัด ประเทศไทย

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิมเจนส์ จำกัด เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2567 เว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร