

อะพรีพิแทนต์**ความแรง 80 และ 125 มิลลิกรัม****ชนิดแคปซูล****ชื่อการค้า Aprepilor Trio****(อะพรีพิลอร์ ทรีโอ)****1. ยานี้คืออะไร****1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า อะพรีพิแทนต์ (aprepitant) เป็นยาในกลุ่มด้านการคลื่นไส้ อาเจียน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้สั่งใช้โดยแพทย์เพื่อ

- ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียนระดับสูงและปานกลาง อันเนื่องมาจากการได้รับยาเคมีบำบัดในผู้ใหญ่ และวัยรุ่นตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป
- ใช้เป็นการรักษาร่วมกับยาแก้อาเจียนอื่นในการป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังใช้ยาฟิโนไซด์ หรือ ซิสซาไพเรด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
- เป็นผู้ป่วยโรคตับ
- กำลังตั้งท้อง วางแผนที่จะตั้งท้องหรือกำลังให้นมลูก
- กำลังคุมกำเนิดโดยใช้ฮอร์โมน
- กำลังใช้ยาต่อไปนี้

- ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วอร์ฟาริน
- ยาคุมกำเนิดบางชนิด
- ยาแก้ปวดไมเกรน เช่น เออร์โกทามีน
- ยาต้านมะเร็งบางชนิด เช่น อิริโนทีแคน

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามเปิด หัก หรือเคี้ยวเม็ดแคปซูล
- กินยาวันละครั้ง พร้อมน้ำสะอาดหนึ่งแก้ว

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอ กินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- **พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ** เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดตลอดระยะเวลาการรักษา และต้องใช้ต่อไปอีก 2 เดือนหลังจากใช้ยานี้
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เนื่องจากยานี้อาจทำให้ง่วงซึม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจหรือกลืนลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องผูก อาหารไม่ย่อย ไม่อยากอาหาร
- ปวดหัว รู้สึกเหนื่อย
- สะอึก
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา**แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”****6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**• ลักษณะยา**

แคปซูลสีขาว พิมพ์อักษร “80 mg” สีดำ มีตัวยา 80 มิลลิกรัม

แคปซูลสีชมพู-ขาว พิมพ์อักษร “125 mg” สีดำ มีตัวยา 125 มิลลิกรัม

• ด้วยาสาคัญ

อะพรีพิแทนต์ 80 มิลลิกรัม ต่อ แคปซูล

อะพรีพิแทนต์ 125 มิลลิกรัม ต่อ แคปซูล

- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส (hydroxypropylcellulose), โซเดียมลอริลซัลเฟต (sodium laurilsulfate), ซูโครส (sucrose), ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส (cellulose, microcrystalline)

ผู้ผลิต

Ethypharm เมืองเลอ แกรนด์ เคววิลลี ประเทศฝรั่งเศส

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท อเมริกัน ไตวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด

เลขที่ 1 อาคารอีสทวอเตอร์ ชั้นที่ 16 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.

• <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>• <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 11 มกราคม 2567