

## โดมเพอริโดน

10 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

ชื่อการค้า **Motilium® (Film-coated tablet)**  
(โมทีเลียม (ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม))

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โดมเพอริโดน (domperidone) เป็นยาในกลุ่มเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาอาการไม่สบายท้องเนื่องจากอาหารเคลื่อนผ่านไปยังกระเพาะอาหารและลำไส้ช้า
- รักษาอาการไม่สบายท้องเนื่องจากโรคกรดไหลย้อน
- รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นในตำรับ
- ห้ามใช้ร่วมกับยาต้านเชื้อราคิโตโคนาโซล ยาปฏิชีวนะอีริโทรไมซิน และยาอื่นๆ อีกหลายชนิดเพราะอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
- มีเลือดออกในทางเดินอาหาร ลำไส้อุดตัน หรือลำไส้ทะลุ
- เป็นโรคตับ
- เป็นโรคเนื้องอกต่อมไต้สมอง

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - เป็นโรคไต
  - เป็นโรคหัวใจ
  - แขนงตาลแล็กโทส
  - มีภาวะผิดปกติของเกลือแร่ในกระแสเลือด
  - ตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร
  - ต้องการใช้นานี้ในเด็ก
  - อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- ไม่ใช้ยานี้เกินกว่าขนาดยาที่แพทย์สั่ง
- กินยานี้ก่อนอาหาร

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้มื้อถัดไปให้รอกินตามปกติ ไม่ต้องกินเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ง่วงซึม สับสน ควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น การกระพริบหรือขยับตา การแลบลิ้นหรือตัวดิ้น โดยเฉพาะในเด็ก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที พร้อมยาหรือบรรจุภัณฑ์

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม อ่อนเพลีย มึนงงได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขีรถหรือทำงานกับเครื่องจักร
- หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์ ยานอนหลับ หรือยากล่อมประสาท เพราะอาจเสริมฤทธิ์ให้ง่วงซึมมากขึ้น

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษบวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- เกิดความผิดปกติในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น ปัสสาวะไม่ออก กระพริบตา แลบลิ้น กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง กระตุก
- รู้สึกหัวใจเต้นผิดปกติก่อนหรือหัวใจเต้นช้าลงมาก หมดสติ และช็อค

**“ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- น้ำหนักไหลในผู้ชายหรือในผู้หญิงแม้มิได้ให้นมลูก
- เต้านมโตขึ้นในเพศชาย
- สมรรถภาพทางเพศลดลง
- ประจำเดือนไม่ปกติหรือไม่มาเลย
- ปวดท้อง ไม่สบายท้อง ท้องเสีย
- ปากแห้ง เหงื่อออกมาก ปวดศีรษะ มึนงง ง่วงซึม

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้งอย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือและสายตาเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีขาวถึงสีเหลืองอ่อน เม็ดกลมมน ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร “JANSSEN” อีกด้านหนึ่งมีอักษร “M”  
10
- ตัวยาสาคัญ คือ โดมเพอริโดน
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ไฮโดรจีเนทคอตตอนซิด ออยล์, ไฮโปเมลโลส, แลคโตสโมโนไฮเดรต, แมกนีเซียมสเตียเรต, แป้งข้าวโพด, ไมโครคริสตัลลิน เซลลูโลส, โพลีวิโดน, แป้งมันฝรั่ง, โซเดียมลอริล ซัลเฟต

#### ผู้ผลิต

Lusomedicamenta Sociedade Técnica  
Farmacêutica, S.A., Barcarena ประเทศโปรตุเกส

#### ผู้นำเข้า/ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด  
กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 1800-333-666 (โทรฟรี ยกเว้นโทรศัพท์มือถือ)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 14 มิถุนายน 2566  
(CCDS version 24 Jan 2018)

**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข**

1. ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของตับบกพร่องระยะปานกลางถึงรุนแรง
2. ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีหรือเคยมีภาวะความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (QT prolongation) หรือได้รับยาอื่นที่ส่งผลให้การทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจยาวขึ้น เช่น cisapride erythromycin ketoconazole
3. ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะโปแทสเซียม และแมกนีเซียมต่ำ
4. ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 เช่น ketoconazole erythromycin cimetidine omeprazole เพราะจะทำให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร