

บอร์เทโซมิบ 1 และ 3.5 มิลลิกรัม

ชนิดฉีด

[บอร์เทโซมิบ อัลโวเจน 1 มิลลิกรัม]

[บอร์เทโซมิบ อัลโวเจน 3.5 มิลลิกรัม]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า บอร์เทโซมิบ (Bortezomib) เป็นยาในกลุ่มรักษามะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ยานี้เดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับยาดีอกโซรูบิซิน เดกซาเมทาโซน ในการรักษาโรคมะเร็งชนิดมัลติเพิล ไมอีโลมาในระยะลุกลามที่เคยรักษาอย่างน้อย 1 ครั้งและไม่เหมาะต่อการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
- ใช้ร่วมกับยาเมลฟาแลน เพรดนิโซโลน ในการรักษาโรคมะเร็งชนิดมัลติเพิล ไมอีโลมา ซึ่งยังไม่เคยได้รับการรักษาและไม่เหมาะต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ขนาดสูงร่วมกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
- ใช้ร่วมกับยาเดกซาเมทาโซน ทาลีโดมายซึ่งยังไม่เคยได้รับการรักษาและเหมาะต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ขนาดสูงร่วมกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
- ใช้ร่วมกับยาริทูซิแมบ ไชโคลฟอสฟามาย ดีอกโซรูบิซิน เพรดนิโซโลน ในการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแมนเทิลเซลล์ซึ่งยังไม่เคยได้รับการรักษาและไม่เหมาะต่อการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้

- ห้ามฉีดยานี้เข้าช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- หญิงมีครรภ์และให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาให้กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้ถึงเวลากินยาของมื้อถัดไป ให้ออกไปกินมื้อถัดไปเลย และห้ามเพิ่มยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ ไม่ควรเพิ่มหรือลดขนาดยาเอง
- พบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก

- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ท้องผูก ท้องเสีย ปวดท้อง ปวดหัว เมื่ออาหาร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผลิตโดย Oncomed manufacturing a.s., Czech Republic.
แบ่งบรรจุโดย GE Pharmaceuticals, Ltd., Bulgaria

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย :

บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ตุลาคม 2561

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร