

เพมีเทรกเซด
ความแรง 500 มิลลิกรัม
ชนิดรูปแบบผงแห้งสำหรับฉีด
ชื่อการค้า Pemexed 500
(พีมีเซ็ด 500)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เพมีเทรกเซด (pemetrexed) เป็นยา
รักษาโรคมะเร็งปอด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด หลังแพทย์
ตรวจรักษาแล้วเห็นว่าต้องใช้ยานี้
- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต หรือ
มะเร็งปอดชนิดไม่ใช้เซลล์เล็ก หลังแพทย์ตรวจ
รักษาแล้วเห็นว่าต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เมื่อได้รับหรือกำลังจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข
เหลือง
- ⊗ เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาในกลุ่ม
กรดโฟลิก
- ⊗ เมื่ออยู่ในระยะให้นมลูก เพราะทำให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงต่อเด็ก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือ เภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีภาวะโรคตับ ไต หัวใจ หรือน้ำท่วมปอด
- กำลังหรืออยู่ระหว่างการฉายรังสี
- กำลังกินหรือฉีดยาแก้ปวด อักเสบ หรือฉีดวัคซีน
- ผู้หญิงที่วางแผนมีลูก กำลังตั้งท้องหรืออยู่ในระยะ
ให้นมลูก เพราะยาทำให้เกิดอันตรายต่อเด็ก
- ผู้ชายที่ต้องการมีลูก เพราะยาอาจทำให้มีลูกยาก
- หากคุณต้องขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร

3. วิธีการใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิด
และความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่
รุนแรง เช่น มีไข้ ท้องเสีย มีแผลในปาก เลือดออก
และหยุดยาก อาการคันหรือตุ่มพุพอง หายใจลำบาก
เจ็บหน้าอก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม
ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจาก
ที่สูง
- แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลว่ากำลังใช้ยานี้
- ห้ามฉีดวัคซีนป้องกันไขเหลือง กรณีจำเป็นต้องฉีด
วัคซีน ให้ใช้วัคซีนชนิดเชื้อตาย
- ระหว่างใช้ยานี้ ผู้หญิงต้องคุมกำเนิดและหยุดให้นม
ลูก

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ไอแบบมี
เสมหะเป็นเลือด
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
หรือเลือดออกผิดปกติ
- มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส เหงื่อออก หนาวสั่น
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ

- มีอาการเลือดออกจากเหงือก ปาก จมูก จ้ำเลือดที่
ผิวหนัง บัสสาวะสีแดงหรือชมพู
- หยุดหายใจชั่วคราว เจ็บหน้าอกไอมีเสมหะปนเลือด
- รู้สึกอ่อนล้า รู้สึกหิวๆ เหมือนใจจะขาด หน้าซีด
“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล
หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดูอาการ แต่ ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือ พยาบาล

- คลื่นไส้ อาเจียน คออักเสบ ท้องร่วง ท้องผูก
ปวดท้อง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
- ผมร่วง การรับรสเปลี่ยนไป

“หากมีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- กรณีผสมยาแล้ว ใช้ยาหลังผสมทันที หากไม่ใช้
ทันทีสามารถเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
ได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- พีมีเซ็ด 500 เป็นยาผงปราศจากเชื้อสำหรับฉีด สีขาว
 - พีมีเซ็ด 500 ประกอบด้วย ตัวยาเพมีเทรกเซด
แมนนิทอล โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดไฮโดรคลอริก
 - ผู้ผลิต Gland Pharma Limited, India
 - ผู้นำเข้า บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
สมุทรปราการ ประเทศไทย
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร