

เบโพแทสทิน
ความแรง 10 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า TALION® (ทาลิออน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เบโพแทสทิน (bepotastine) มีตัวยา 10 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาอาการเยื่อจมูกอักเสบ ลมพิษ อาการคันจากผื่นหรือผิวหนังอักเสบ ในผู้ป่วยที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ ห้ามใช้เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นผู้ป่วยโรคไตเพราะยานี้ขจัดออกทางไต
 - เป็นผู้สูงอายุเพราะอาจมีการทำงานของไตลดลง
 - วางแผนจะตั้งท้อง หรือ กำลังตั้งท้องในช่วง 3 เดือนแรก
 - กำลังให้นมลูก
 - กำลังใช้ยาสเตอรอยด์แบบกินเพราะอาจต้องมีการปรับขนาดยาสเตอรอยด์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ขนาดยาโดยทั่วไป กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและเย็น หรือกินยาตามที่แพทย์แนะนำ

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- งดดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงซึม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ง่วงนอน อ่อนเพลีย
- กระหายน้ำ
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ปวดท้อง ท้องเสีย ไม่สบายท้อง

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นแสงแดดโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยานี้ให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** เม็ดกลมสีขาว มีตัวอักษร TA และตัวเลข 133 อยู่คนละข้างของเส้นแบ่งครึ่งยา อีกด้านมีตัวเลข 10
- ตัวยาสําคัญ** เบโพแทสทิน
- ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ Magnesium Stearate (แมกนีเซียม สเตียเรต), Microcrystalline Cellulose (ไมโครคริสทัลไลน์เซลลูโลส), Talc (ทอลค์), Hypromellose (ไฮโพรเมลโลส), Macrogol 6000 (แมโครโกล 6000), D-mannitol (ดี-แมนนิทอล)

ผู้ผลิต บริษัท มิตรูมิชิ ทานาเบะ ฟาร์มา อินโดนีเซีย จำกัด, บันดุง, ประเทศอินโดนีเซีย
ผู้นำเข้า บริษัท มิตรูมิชิ ทานาเบะ ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จำกัด, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 สิงหาคม 2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

