

อบิราทีโรน 250 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด [อบิราทีโรน เทวา]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า อบิราทีโรนอะซิเตท (abiraterone acetate) เป็นยาในกลุ่มยาต้านมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามในผู้ชาย โดยกินพร้อมกับยาเพรดนิโซโลน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ยานี้ในผู้หญิง
- ห้ามใช้ยานี้หากเคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นๆในยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- หากท่านมีภาวะต่อไปนี้ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากการใช้ยา
 - ระมัดระวังการใช้ยานี้ในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี และผู้สูงอายุ เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
 - ผู้ที่มีภาวะการทำงานของตับบกพร่องรุนแรง ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรคนั้นๆ
- ยานี้กินวันละครั้ง ตอนท้องว่าง โดยกินพร้อมกับยาเพรดนิโซโลนตามที่แพทย์สั่ง
- ให้กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมน้ำเปล่า ห้ามแบ่ง เคี้ยว หรือบดเม็ดยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยา ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็นสองเท่า
- หากลืมกินยานี้ หรือลืมกินยาเพรดนิโซโลนเกินกว่า 1 วัน ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรโดยทันที

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากกินยาเกินขนาดให้หยุดกินยา และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น หัวใจเต้นเร็ว ปวดหัว มือเท้าบวม ร้อนวูบวาบ ไอ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
- หากเด็กกินยานี้ ให้รีบนำเด็กส่งโรงพยาบาลทันที และนำขวดยานี้ติดตัวไปด้วย
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนกินยามื้อถัดไป

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ให้ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง หรือใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย ในกรณีที่มิเพรสสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ หรือหญิงที่มีโอกาสจะตั้งครรภ์ได้
- ห้ามกินยานี้ในขนาดสูงกว่าที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- ไม่ควรกินยานี้พร้อมกับอาหาร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอันตรายที่อาจเกิดจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- หัวใจเต้นเร็ว ปวดหัว ร้อนวูบวาบ รุนแรง
- รู้สึกอ่อนเพลียมาก
- หน้ากลมบวม ตัวบวม มือและเท้าบวม
- ไอมากผิดปกติ
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย รุนแรง
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ

- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจำกัดตามผื่นหรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- เวียนศีรษะ ตาพร่า
- เมื่อยล้า

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถยนต์ ห้องน้ำ ห้องครัว เป็นต้น
- ควรหิบบยาออกจากขวด เมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามหิบบยาออกจากขวดและทิ้งไว้ เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- หญิงตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ให้ใส่ถุงมือหากมีความจำเป็นต้องสัมผัสยานี้ ไม่ควรหิบบ จับ สัมผัสยานี้ด้วยมือเปล่า

ผลิตโดย : เทวา ฟาร์มาซูติคัล อินดัสทรี ลิมิเต็ด, ประเทศอิสราเอล
นำเข้าโดย : บริษัท สยามการแพทย์ จำกัด, กรุงเทพมหานคร
จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 5 กรกฎาคม 2561

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร