

ดูพิลูแมบ
ความแรง 300 มิลลิกรัม ต่อ 2 มิลลิลิตร
ชนิดฉีด
ชื่อการค้า DUPIXENT (ดูพิเซน)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร
ยานี้มีชื่อว่า ดูพิลูแมบ (dupilumab) มีตัวยา 300 มิลลิกรัม ต่อ 2 มิลลิลิตร
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร
ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคผิวหนังภูมิแพ้ผิวหนัง ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงรุนแรง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร
- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้
- ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา ในกรณีต่อไปนี้
 - มีปัญหาเกี่ยวกับตา
 - ติดเชื้อพยาธิ หรือปรสิต
 - เป็นหอบหืด
 - กำลังฉีดวัคซีน
 - กำลังให้นมลูก
 - กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนจะตั้งท้อง เนื่องจากยังไม่ทราบว่ายานี้มีผลต่อทารกในท้องหรือไม่
- “ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา”

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดยาและวิธีใช้
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - วิธีใช้ยา
 - ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง บริเวณต้นขา หรือหน้าท้อง ครั้งละ 1 เข็ม ทุก 2 สัปดาห์

- 3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร
- หากลืมฉีดยาไม่เกิน 7 วัน ให้ฉีดยาทันทีที่นึกขึ้นได้ ส่วนการฉีดยาเข็มถัดไปให้ฉีดตามกำหนดเดิม
 - หากลืมฉีดยาเกิน 7 วัน ให้รอฉีดยาตามกำหนดการฉีดยาครั้งถัดไป

- 3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
- ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบทันที และให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไปพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากการใช้ยา
- ห้ามปรับขนาดยา หรือหยุดใช้ยารักษาโรคหืดเองโดยไม่แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ
- ให้เฝ้าระวังการเกิดภาวะเยื่อぶตาอักเสบหรือกระจกตาอักเสบ หากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับตาให้รายงานให้แพทย์ที่ทำการรักษาทราบ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หากใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นพองหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
 - ตาอักเสบ เช่น ตาแดง ตาบวม คัน การมองเห็นเปลี่ยนไป
 - เป็นไข้ เจ็บข้อ ต่อมม้ามเหลืองโต
 - โรคเรื้อรังที่ปาก หรือริมฝีปาก
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”
- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที
- อาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บยาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามแช่แข็ง
- ห้ามเขย่ายา
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะและสีของยา เป็นสารละลายใสถึงขุ่นเล็กน้อย ไม่มีสีถึงมีสีเหลืองอ่อน
- มีส่วนประกอบที่เป็นตัวยาสำคัญ คือ ดูพิลูแมบ 300 มิลลิกรัม ต่อ 2 มิลลิลิตร
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แอล-อาร์จินีนไฮโดรคลอไรด์, แอล-ฮิสทิดีน, พอลิซอร์เบต 80, โซเดียมอะซีเทต, ซูโครส

ผู้นำเข้า บริษัท ซาโนฟิ-อเวนต์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 6 สิงหาคม 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร