

## บูโรซูแมบ

ความแรง 10, 20 และ 30 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
ชนิดสารละลายสำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง  
ชื่อการค้า **Crysvita (คริสวิต้า)**

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า บูโรซูแมบ (Burosumab)

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเอ็กซ์ตามการวินิจฉัยของแพทย์

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังใช้ยาหรืออาหารเสริมที่ส่วนประกอบของฟอสเฟตหรือวิตามินดี
- มีระดับฟอสเฟตในเลือดอยู่ในระดับปกติหรือสูงกว่าปกติ
- เป็นโรคไตบกพร่องรุนแรง

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
- อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี
- กำลังกินยาที่มีส่วนประกอบของแคลเซียม

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- ยานี้ใช้สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือพยาบาลเท่านั้น
- ขนาดยาและความถี่ในการฉีดยาให้เป็นไปตามที่แพทย์กำหนด

#### 3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากลืมมาฉีดยา ให้รีบแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อทำการนัดหมายการฉีดยาใหม่

#### 3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามอาการหรืออันตรายจากการใช้ยา
- ยานี้อาจทำให้เวียนศีรษะ ควรระมัดระวังในการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“หากมีอาการเหล่านี้  
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

#### 5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- ฟันผุ ปวดฟัน เกิดฝีหรือหนองที่ฟันหรือเหงือก
- ไอแห้ง หรือ ไอมีเสมหะ
- เวียนศีรษะ ปวดหัว
- คลื่นไส้ อาเจียน

- ท้องเสีย หรือ ท้องผูก
- ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ
- เกิดผื่น คัน บวม แดง ข้ำ หรือเจ็บบริเวณที่ฉีดยา
- อาการชาอยู่ไม่สุข

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง  
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- หากท่านได้รับยากลับบ้าน ให้เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง
- เก็บยานี้ให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา สารละลายสำหรับฉีดในขวดแก้วใสพร้อมจุกยางและฝาอลูมิเนียม
- ตัวยาสำคัญ บูโรซูแมบ
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ แอล-ฮิสทิดีน, ดี-ซอร์บิทอล, แอล-เมไทโอนีน, โพลีซอร์เบท 80 และ น้ำ

ผู้ผลิต: บริษัทเคียวเว คีริน จำกัด ทากาซากิ ประเทศญี่ปุ่น  
ผู้นำเข้า: บริษัท เคียวเว คีริน (ไทยแลนด์) จำกัด ประเทศไทย  
ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ประเทศไทย  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx)

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร