

**เลโทรโซล**  
**ความแรง 2.5 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม**  
**ชื่อการค้า LETROZOLE 2.5 EURODRUG**  
**(เลโทรโซล 2.5 ยูโรดรัก)**

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าเลโทรโซล 2.5 ยูโรดรัก

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมในหญิงที่หมดประจำเดือน และแพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้
- ⊗ ห้ามใช้ในหญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือน
- ⊗ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - เป็นโรคไต โรคตับ
  - เคยกระดูกหัก หรือ เป็นโรคกระดูกพรุน
  - ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้
- ยานี้มีส่วนผสมของน้ำตาลแลคโตส ควรระวังหากมีประวัติแพ้น้ำตาลบางชนิด

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรกินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนเม็ดยาทั้งเม็ด พร้อมดื่มน้ำตามอย่างน้อยหนึ่งแก้ว
- กินยานี้วันละหนึ่งครั้ง
- ควรกินยาให้ตรงเวลาทุกวัน โดยกินยานี้พร้อมอาหารหรือตอนท้องว่างก็ได้
- ห้ามหยุดยาเอง

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้รีบกินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้กับการกินยาครั้งถัดไป ให้ข้ามเม็ดที่ลืม แล้วรอกินยาเม็ดต่อไป
- ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีและนำยานี้ติดตัวไปด้วย

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- หากกินยานี้แล้ววงนอน รื่นเวียน ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือใช้เครื่องจักรกล
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งว่ากินยานี้อยู่
- คำเตือน ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง
- ตัวเหลือง ตาเหลือง บัสสาวะสีเข้ม
- มีอาการอ่อนแรง ชาตามร่างกาย พูดหรือหายใจลำบาก
- เจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง
- บวมแดงตามเส้นเลือดดำ กัดแล้วเจ็บ
- ไข้สูง หนาวสั่น มีแผลในปาก
- เส้นเอ็นอักเสบ หรือฉีกขาด
- หัวใจเต้นเร็ว เจ็บหน้าอก ผิวซีดเขียว ปวดขาหรือเท้าจับปล้น

“ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ผื่นแดง ปากแห้ง คอแห้ง
- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้
- เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ผม่วง
- ร้อนวูบวาบ เหงื่อออกมาก
- ปวดในกระดูกหรือในข้อ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เป็นยาเม็ดกลม นูนทั้งสองข้าง เคลือบฟิล์มสีเหลือง ด้านหนึ่งมีอักษรว่า L900 และอีกด้านมีตัวเลข 2.5
- **ตัวยาสสำคัญ** เลโทรโซล 2.5 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ lactose monohydrate (แลคโตสโมโนไฮเดรท), microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส), magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรท), colloidal anhydrous silica (คอลลอยด์ซิลิกา), pregelatinized starch (พรีเจลาติไนซ์ สตาρχ), sodium starch glycolate (โซเดียมสตาρχไกลโคเลต), และสารเคลือบฟิล์มแบบพร้อมใช้

ผู้ผลิต : SYNTHON HISPANIA, SPAIN

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย :

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มกราคม 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร